

除土香草

陳正旺

土香草屬於莎草科，屬宿根性多年生雜草，草根長得很深。該雜草現無特效藥可根除，但地上部可用二、四—D或克蕪踪（Gramoxone）毒殺，經數次後，地下塊根可能失去發芽作用，其他拉草（Classo）殺草劑與衛農（Vernam 6E）殺草劑對土香之塊根有抑制發芽的作用，但藥效消失後，土香草立即長出。

在空地若用克蕪踪殺草，經一星期可種薑。在薑種植後出土前，土壤表面噴拉草殺草劑，可保二個月內雜草不再長出。

克蕪踪用藥量，每公頃二—三公升，以二—四百倍液均勻噴於雜草株上，經日光照射後，雜草即可枯死，可向台北市仁愛路三段二六號二樓嘉泰企業股份有限公司洽購。

拉草殺草劑每公頃用藥量三—五公升，以二—三百倍液均勻噴灑於土壤表面，可毒死發芽的雜草種子，此種殺草劑，可向台北市中山北路二段二十

三號七樓孟山都台灣分公司洽購。
註：台東縣池上鄉富興村十一鄰一四四號會興順農友來信詢問有關殺草劑，請參考。

飼養肉牛

林誠華

一頭牛所需牧地而積因地區、水泉、土質與施肥量等不同，故其產量有差別，因此，計算一頭牛所需牧地多少，不如以一頭牛一天草量若干做標準。一般言之，牛的食草量大約是體重的百分之十至百分之十二，如果一頭牛平均體重在一百公斤，那麼他一天所要吃的草應在二十至二十五公斤，一年需約一萬公斤。如果一公頃一年生產青草四萬公斤，那麼一公頃牧地可維持四頭體重二百公斤牛一年的草料。至於人工割草，平均一人一工可割草約三百公斤至五百公斤左右。牧牛吃雜草，當然沒有牧草來得好。

本省北部地區灌溉便利排水良好的耕地，種植狼尾草較為適宜，生草量一公頃年約在三十萬公

斤左右，如果一甲地年產量可達二十五萬公斤時，足夠飼養一至二歲牛隻十至十五頭。

養肉牛仍以牧草為主要粗料，至於補充精料應在飼養末期，換句話說，在肉牛出賣前三個月左右，每天補助三至五公斤精料，以促進增重改善肉質。

肉牛飼養時間大約在一·五歲至二歲間，平均體重應在四百至四百五十公斤左右，本省黃牛體型不大，體重亦輕，除非利用純種肉牛改良，增大其體型，增加其體重，否則僅以牛肉出售，利潤不會太大。

台灣省畜產試驗所恒春分所（地址在恒春墾丁），目前飼養聖達改良牛，價格每頭（一歲左右）大約五、六千元，純種聖達小牛尚無對外推廣。

都市附近的農友，若想養肉牛，我們建議您收購些產奶少的，或將要淘汰的乳牛加以肥育，然後出賣，這樣在都市附近比飼養小牛變大牛，所得肉牛的利益更為優厚。

註：台北縣新莊鎮中港里一五九號蕭登貴農友來信詢問有關肉牛問題，請參考。

富士 霸王

衝力大
速度超120公里



〈五段變速〉 1000 c.c. 強力車

- 採用強力高性能引擎、馬力強、衝力特大。
- 五段變速，加速超群，起動到200公尺只需11.6秒，冠壓群雄。
- 速度超120公里，驕悍、快捷、氣魄豪邁。
- 載重、爬坡力高達33°，爬山、越野、勇猛驕健。
- 富士霸王豪華三色「銀紅」、「銀藍」、「黑」任君選擇。

