

香 菇

無殘量問題，但施藥時常會因風吹多少沾着在稻穗，如此最少需候三星期或更長時日後再採收，殘留藥量消失後自無問題。(洪維懷)

香菇櫛木噴尿素

對幼菇反有肥害

【問】：(一)香菇櫛木噴尿素稀釋液對香
菇是否有利？
(二)香菇櫛木可否噴荷蘭藥？
(三)香菇乾時，其溫度調節方法及病蟲
防治方法如何？(台南市自強街二四號何武
明)

【答】：(一)香菇櫛木噴尿素稀釋液並無
卓效，反而有害於幼菇。
(二)香菇櫛木有幼菇時，可以噴維他命B₁
系的促進劑。其他植物生長素，可能也有效
，但用量不明，若用太多，可能使菇型變為
畸型。
(三)香菇之乾燥法及病蟲害防治，請參見
前期豐年。(杜自強)

草 藥

薈香草宜晒乾

【問】：(一)薈香草種後多久可
收穫？
(二)薈香草製藥方法及其價值如何？
(三)種了如何繁殖，何處有售？
(四)是否有藥廠收購薈香草？(屏東縣高
樹鄉廣興村鍾麟英)

【答】：(一)薈香是多年生草本，其收穫
需視其生育情形，如生育良好，自種後半年
即可行第一次收割。
(二)鮮草收割後除陰乾，即為漢藥薈草。將
採收之葉莖充分乾燥後，以水蒸氣蒸餾，即
得薈香油。薈香油是清涼解熱藥，可治感冒
、頭痛，又為健胃藥等。保留劑可為香水調
合用。薈香草現今市價每公斤乾草約三十元
，並可外銷越南、香港、韓、泰等國。
(三)種子在本省並無銷售，繁殖方法以扦
插為主。其品種有馬來西亞種、廣東種、臺
灣在來種等。
(四)本省尚無藥廠收購薈香。(楊泰裕)

寶 作 連 開 素 根

水稻出穗後的各種病害防治法

這幾年來，水稻出
穗後，即發生下列的
病害：

- 乾莖倒伏
- 窒 息 病
- 穗首稻熱病
- 穗紋枯病
- 未熟脫落

農友們遇到這個病害時，心
情急迫，而亂噴農藥，但是都無
法治癒。

現在外國已經研究成功下列
的防治理論：

1. 出穗後先噴灑水銀劑、多
穗等持久性殺菌劑，以防病菌寄
生。
2. 噴灑活性錳及鐵等各種微
量要素，加強葉綠素的作用迅速
恢復衰弱現象。
3. 同時噴灑尿素，促進蛋白
質的結成作用，而強化組織。

要應用上記的理論，於出穗
後；即時噴灑下列的配方即可：

1. 水：15公升
 2. 水銀劑，多穗等持久性殺菌
劑。
 3. 開根素：8公克
 4. 尿素：75公克
 5. 非肥皂粉：10公克
- 每隔 5 天噴灑一次，3 次即可。

天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉中山路 41 之 14 號
電話：966016 郵政劃撥 5179 號

殺菌劑 + 開根素 + 尿素 + 非肥皂

(偏僻地區請到郵局利用郵政劃撥儲金
5179 號匯款採購送貨郵費本公司負擔
安全迅速方便無論一包二包無任歡迎)

本秋季 日本 美國 等新種子已到齊

- 長岡 夕キイ種苗會社產品各種現貨供應
- 天理 日本大和農園產品
- 大和一號甘藍 耐暑、耐寒、抗病力強、結球最快，50
155 天以前可收穫，重量二斤半左右，50
耐暑、耐寒、抗病力強，60 天可收，重
量三斤以上，藥質柔軟可口。
- 金角甘藍 本品種系洋種與日本菠菜交配育成
生產者一致公認，耐病耐寒生長快，可
在八月至三、四月出圃時栽植，如同時
播種比任何品種收穫產量數倍。
- 巨豐菠菜 交配種皮綠色，黑花紋肉鮮黃，每株十
五粒以上，抗病力強，每粒重一、五公
斤，甘味甜度高。
- ミカサ菠菜
- 小玉西瓜
- 縞王西瓜、新富士西瓜、ニユーメロ
- 甜瓜、金城甜瓜、秋季新到草花種
- 子防濕繪袋原封數十種。

總代理
台灣

新裕興企業股份有限公司 新 合 成 種 子 行

臺北市迪化街一段一四九號
臺灣郵政劃撥：502 號 TEL: 543787