無殘量問題，但施藥時常會因風吹多少沾着在稻穗，如此最少需候三星期或更長時日後再採收，殘留藥量消失後自無問題。（洪維懷）

香菇

香菇椹木噴尿素對幼菇反有肥害

【問】：㈠香菇椹木噴尿素稀釋液對香菇是否有利？

㈡香菇椹木可否噴荷爾蒙？

㈢香菇乾燥時，其溫度調節方法及病蟲防治方法如何？（台南市自強街二四號何武明）

【答】：㈠香菇椹木噴尿素稀釋液並無卓效，反而有害於幼菇。

㈡香菇椹木有幼菇時，可以噴維他命B_1系的促進劑。其他植物生長素，可能也有效，但用量不明，若用太多，可能使菇型變爲畸型。

㈢香菇之乾燥法及病蟲害防治，請參見前期豐年。（杜自强）

藥草

藿香草宜晒乾

【問】：㈠藿香草種後多久可收穫？

㈡藿香草製藥方法及其價值如何？

㈢種子如何繁殖，何處有售？

㈣是否有藥廠收購藿香草？（屏東縣高樹鄉廣興村鍾麟英）

【答】：㈠藿香是多年生草本，其收穫需視其生育情形，如生育良好，自種後半年即可行第一次收割。

㈡鮮草收割後陰乾，即爲漢藥藿香。將採收之葉莖充分乾燥後，以水蒸氣蒸餾，即得藿香油。藿香油是清凉解熱藥，可治感冒、頭痛，又爲健胃藥等。保留劑可爲香水調合用。藿香草現今市價每公斤乾草約三十元，並可外銷越南、香港、韓、泰等國。

㈢種子在本省並無銷售，繁殖方法以扦插爲主。其品種有馬來西亞種、廣東種、臺灣在來種等。

㈣本省尚無藥廠收購藿香。（楊永裕）

寶作連
開根素

這幾年來，水稻出穗後，即發生下列的病害：

乾莖倒伏
窒息病
穗首稻熱病
穗紋枯病
未熟脫落

農友們遇到這個病害時，心情急迫，而亂噴農藥，但是都無法治癒。

現在外國已經研究成功下列的防治理論：

1. 出穗後先噴灑水銀劑、多穗等持久性殺菌劑，以防病菌寄生。
2. 噴灑活性錳及鐵等各種微量要素，加強葉綠素的作用迅速恢復衰弱現象。
3. 同時噴灑尿素，促進蛋白質的結成作用，而強化組織。

要應用上記的理論，於出穗後；即時噴灑下列的配方即可：

1. 水：15公斤
2. 水銀劑，多穗等持久性殺菌劑。
3. 開根素：8公克
4. 尿素：75公克
5. 非肥皂粉：10公克

每隔5天噴灑一次，3次即可。

水稻出穗後的各種病害防治法：

殺菌劑＋開根素＋尿素＋非肥皂。

天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉中山路41之14號
電話：966016　郵政劃撥5179號

偏僻地區請到郵局利用郵政劃撥儲金5179號滙款採購送貨郵費本公司負擔
安全迅速方便無論一包二包無任歡迎

本秋季日本美國等新種子已到齊

長岡交配 **タキイ種苗會社產品各種現貨供應**

天理交配 **大和一號甘藍**

耐暑、耐寒、抗病力強、結球最快，50－55天以前可收穫，重量二斤半左右。

金甲甘藍

耐暑、耐寒、抗病力強，60天可收，重量三斤以上，葉質柔軟可口。

巨豐菠菜

本品種系洋種菠菜與日本菠菜交配育成生產者一致公認，耐病耐寒生長快，可在八月至三、四月間隨時栽植，如同時播種比任何品種收穫產量數倍。

ミカサ菠菜

交配種皮綠色，黑花紋肉鮮黃，每株十五粒以上，抗病力強，每粒重一．五公斤，甘味甜度高。

小玉西瓜

縞王西瓜、新富士西瓜、ニューメロン甜瓜、金城甜瓜、秋季新到草花種子防濕繪袋原封數十種。

總代理 台灣

新裕興企業股份有限公司
新合成種子行
臺北市迪化街一段一四九號
臺灣郵政劃撥：502號　TEL: 543787