

農友經驗



栽培甜椒利益好

甜椒是一種耐旱的果菜，營養價值很高，市價也很好，而且收穫期很長。以今年來說，自三月下旬開始收穫，至八月上旬才行廢耕，曾有一段時期成爲夏季的名貴蔬菜，很有栽培價值。

我在旱田種植甜椒已有兩年。現願將我兩年來的實地栽培經驗，提供給有興趣栽培的農友參考：

(一) 栽培地的選擇：甜椒雖較耐旱，但並不耐濕，因此我選擇了砂質壤土。因爲砂質壤土的滲透力良好，也不會因下雨而積水，更因具有良好的排水作用，因而根部不易腐爛，植株也不致因受浸而枯萎。

(二) 品種的選擇：甜椒品種很多，有厚肉及薄肉兩類，厚肉品種果實大，耐運輸，果實個體重量也較重，產量與收益自然就較高。

我選擇的品種是加州大王品種，該品種屬開張性品種，植株生長強健，果肉厚，產量高。

(三) 疏播育苗與種子預措：甜椒種子的發芽比番茄或一般十字花科蔬菜爲遲。爲促進發芽，我將種子浸水後以濕布包裹，放置在冷涼的地方二十四小時後才播種。苗床以硫酸銨、過磷酸鈣、氯化鉀混合後撒施。與床土充分拌勻後播種。爲求育成健苗，因此播種時儘量疏播。後覆上腐熟堆

肥，灌水後覆稻草，再在草上灌水，至發芽後除去，改用切約半寸至一寸長的稻草覆蓋。苗床期爲預防病蟲害的發生，我以馬拉松八百倍液加大生五百倍液每十天噴射一次。

(四) 堆肥用得多：甜椒是長期性的果菜類，因此我在整地時先在畦的中央施入腐熟堆肥，五厘地用一千二百公斤，並加硝酸銨鈣二十五公斤，過磷酸石灰三十公斤，氯化鉀十五公斤做基肥，然後整畦，才行定植。

(五) 株距大，畦溝也大：由於加州大王是一種開張性的品種，枝條伸展較寬，因此我種植時所做的畦面寬是三尺五寸，畦溝六寸，每畦種兩行，株距一尺五寸。

如此，甜椒中期以後，不但可以充分生長，不致過密。開始收穫時，收穫作業的進行也比較方便。

(六) 施肥的方法：活着後(約定植後十天)開始施追肥，五公畝用硫酸銨五公斤行液施，十五天以後培土，培土前以硫酸銨八公斤、過磷酸鈣五公斤、氯化鉀四公斤混合後施用再行培土，待培土後的第十五天，再以硫酸銨八公斤、過磷酸鈣五公斤、氯化鉀四公斤混合，施於畦溝的兩旁。

(七) 挿立支柱：我選擇的栽培地，雖兩旁均爲蔗園，但求不致因風吹或雨後，由於土質鬆軟，而形成甜椒植株倒伏的現象，我在每株甜椒株旁，都斜插一支四尺高的柱竹做爲支柱，如此，結果枝雖偶有折斷，但情況很輕微，植株便不會倒伏了。

(八) 萌發新枝葉時的管理：結果中期，將有一段時期甜椒會再生新枝葉

，原先的老葉將先後脫落，而生長幼嫩的枝梢與新芽。因此在開始落葉時應以施追肥時的肥料(即五厘地用硫酸銨八公斤、過磷酸鈣五公斤、氯化鉀四公斤)以穴施法施下。施肥時應離植株二十五公分處，掘一小穴施下，然後覆土。並注意噴射一次藥劑，以預防病蟲害。

(九) 防治病蟲害的一劑處方：爲害甜椒的病蟲害很多，雖然我對病蟲害所知有限，但較普遍的病害，我例很清楚，還有蛀入果實爲害的一種黃色幼蟲(大概是螟蛾類的害蟲)以及吸食葉子汁液的蚜蟲等。

在生育初期每十天以馬拉松八百倍液混合大生M-122，五百倍液噴藥一次。開始收穫以後則每十天改用DDVP一千倍液加大生M-145，五百倍液噴射，假如遇到採收時，

必須在噴藥四天後才可採收。還有蝸牛、軟蛭，以捕捉方法防除，遇有少數枯萎的病株，就馬上拔除，倘有腐爛的果實就把它採摘集中堆放，然後與枯萎的病株一齊燒燬。

(十) 適時採收：甜椒的採收不宜過早，也不宜太遲。過早因果實未充分肥大，影響產量與收益。過遲因果肉轉硬，影響品質及市價，更會消耗植株養分，減低生長勢力。因此我都在充分肥大呈淺綠色時採收。

*

*

*

養兔注意兔籠清潔

養兔是一件很好的農家副業，成本少而獲利大，值得提倡。我從前年就開始養兔，至今已有一年，願將一點心得提出來給各位作參考。

(一) 兔籠用竹、木都可以，要訂密，以防小兔的腳夾傷成跛腳。兔籠要保持冬暖夏涼，乾燥清潔，籠內另置一木箱，準備母兔生產用。

(二) 經常給予水分少而清潔的雜飼料，避免兔子養成偏食習慣。

(三) 潮濕的猪菜(甘薯葉)或有露水的菜類，最好不要給兔子吃，免得瀉肚。

(四) 抓兔子時，要一手平提住兩耳朵，另一手扶住臀部，假如祇是提耳朵而不托臀部，易導致流產，使母兔受精無效。母兔生產後如不使再生產，應立將公母兩兔隔離。



(五) 飼料不應僅限於米糠飯或甘藷葉，其他如甘藷皮、骨粉等也可當作飼料用。(台中縣豐原鎮扒寮里扒寮路四十號張燈輝)