

FILITAL

INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
FABBRICAZIONE SODALITÀ E REAG. SODALITÀ
利大意在司公斯哈門羅國美
品出廠工學化多利萊標標屬附

防治 瓜類、菸草白粉病！

兼可殺除紅蜘蛛！請用

* 可利生



號裝五原七公一第記登利
倍千兩至斤公生一第記登利
倍千兩至斤公生一第記登利

現貨進口經銷商：

- 一、福慶公司：臺北市漢口街一段五十七號二樓
- 二、惠光貿易有限公司：臺南市東門路二三一號
- 三、裕台公司農化廠：彰化市和平里和平莊五十五號
- 四、英明貿易有限公司：基隆市郵政信箱八六號
- 五、群英公司：台北市錦州街一二號之二、一樓

臺灣總代理：**青象貿易有限公司**
臺北市漢口街壹段壹肆肆號壹壹壹室
電話：三三六六一七七

司公斯哈門羅國美
標商記登

而多，這是謊話。因蟲會食害沒有藥的田。水稻不會因噴藥防治而愈加猖獗，一定要將錯誤觀念改正過來。

〔常施肥肥當然易引起病蟲病。因有肥料，稻長的好，病蟲也長的好。故多施肥，而加以病蟲害控制，才會有好的稻生長。四種子對病蟲害發生關係少，但對稻之產量及品質有影響。〕

蔬 菜

結球白菜心受損 即無再結球希望

〔問〕：〔濱綠包心白菜播種後四十天，才開始包心，此生育是否正常？〕

〔答〕：〔白菜剛在包心時，即遇二次颱風侵襲，心球被吹開，現時葉葉茂盛，不知還有重復結球的希望否？〕

〔問〕：〔臺北二號矮性敏豆是否適合在台南地區栽培，現在有無比台北二號較好的品種？〕

〔答〕：〔濱綠結球白菜於播種後四十天，開始結球還是正當。〕

〔日前矮性菜豆品種，在台南地區尚無較台北二號好的品種，但可與台北二號相比者有 Pearly 甜菜品種。〕

〔甘藍與花椰菜，番茄與甜椒，紅豆與菜豆〔敏豆〕是同一科。〔白菜〕〔敏豆〕收穫後可種甜椒。〕

〔可購「農業獎勵園藝作物蔬菜篇」較宜。每本新台幣五十五元。〕

〔問〕：〔我想在高冷地種櫻桃蘿蔔，每分地播種量及播種期如何？〕

〔答〕：〔平地栽培季節為十月至四月，高山地帶五月至十月為合適的生育期。每十公畝種子量：〇・八—一・〇公升。種子發芽率在九十%以上的，播種量可減少二成。〕

〔價格每年都有變動，大約每公升十五元。〕

〔每十公畝產量約一千五百公斤。〕

素十二公斤。除尿素外，全部用作基肥，全面施用。尿素在發芽後十二天，用做追肥。〔李樹泉〕

〔問〕：〔蔬菜噴用農藥，需經多少天始可採收食用？〕

〔答〕：〔蔬菜施用農藥經多少天後，始可採收食用，因農藥種類及其性質、施用方法、施藥量以及環境條件等不同而異，如依省頒推廣方法使用：〕

〔以「漂白粉」及「碳酸鈉」稀液，泡洗蔬菜，可否去其殘毒？〕

〔答〕：〔蔬菜施用農藥經多少天後，始可採收食用，因農藥種類及其性質、施用方法、施藥量以及環境條件等不同而異，如依省頒推廣方法使用：〕

〔蔬菜農藥殘量太多，引起食用中毒情形，如殘留農藥與藥劑本身相同時，則與不損入口者相同，祇是入口份量多少，中毒程度高低不同而已。〕

〔用漂白粉、碳酸鈉泡水洗菜，是否能除去農藥殘量，因農藥種類而異。漂白粉能使有機磷劑起氧化，或能使其變為更毒，碳酸鈉能使其加水分解減少毒性，但對於安定性大的農藥如地特靈等則無作用。清潔劑水洗蔬菜，如殘留農藥已存於植物體內則效果不大。目前尚無其他藥品可洗淨蔬菜農藥殘毒。〕

木 竹

種植麻竹 宜在三月

〔問〕：〔麻竹在東部花蓮地區種植，何品種較適宜？〕

〔答〕：〔麻竹品種目前仍在進行選擇試驗中，故尚無品種可資推廣。民間將麻竹分為若干種：如軟枝、長葉、短葉等，但實際上還外形上略有不同，同時是否為遺傳性之變異還不能決定，所以並不可靠。不過，購買竹苗時，最好選竹圍無顯著病害，同時竹葉青翠而葉面寬者，即表示生長健全。可採購一年生幼竹實行栽植。〕

〔最好向台中、南投、雲林採購幼竹。植自行育苗，並不合算。花蓮可在國曆三月下旬栽植。〕