

摘芯、摘芽、整姿：隨苗的生長，將枝葉誘導安排使沒有空隙。主枝、主幹與兩邊的強枝宜連結於支柱式橫架，然後不停地摘芯，摘芽。在台灣三月至四月，氣溫和日照，剛好適合秋菊分枝條件，所以往往有柳芽和花蕾出現。為了使懸崖菊繼續生長起見，發見花芽時，應立即摘除，並不斷地施速效液肥。用電燈照明抑制花芽分化，以渡過春天，否則整個作法會完全失敗。

液肥與追肥：定植十日後，將硫酸溶於水中，澆於盆上，以代澆水。七月中旬左右，將乾肥一把，分三處放於盆內，並以少許培養土加入盆中。七月二十五日與八月上旬，各再施肥培土一次。夏季應遮蔭。自九月上旬起，需有良好的日照。




(設立支柱以鐵絲整理花形)

預行摘芯：自八月一日左右開始，一直到八月十分左右分三段做預行摘芯。此後到「九月最後一次摘芽」的這段期間，中止摘芯。這段期間苗長很快，但切不可摘芽，可任其茁長，才是促使一齊開花的秘訣。

九月的最後一次摘芽：最後一次摘芽，也分三段，大約九月一日開始摘，九月五日再折一次，於九月十日前後終止。

最後的修整：到十月中旬光景，苞蕾差不多出齊了，要施行最後的潤飾。此時要拆除全部支柱，只留下幹的主柱，把第八號鐵絲充分插入根位，主幹與鐵絲沿幹每隔十公分打一個結。外側，再於


並整姿。
整形完畢後，不要使它斷水，但宜注意澆水分量。防治病蟲害應於含苞期撒布藥劑。花盆在修整好的當天應朝向北面放置，之後即改為向南，如此花姿才不會偏向一邊，而能保持自然之美。



花樣內部加上十二號線鐵絲，全部打結，即立假支柱，緩使其向前端垂下來



菊小屋懸的成植



修整後最

傳良張 蟲害下地滅消何如

本省位於亞熱帶，因此土壤環境甚適合地下害蟲的生存。土壤害蟲的種類很多，主要有金針蟲、金龜子、螻蛄、臭蟲、肚蟻、夜盜蟲、跳子、守瓜等數十種，每年使作物遭受損害，若能預先防範，則能事半功倍，年年豐收。

甘諸地下害蟲，可使用阿特靈。使用方法：在種植前將土壤翻攪一次，後將一分地劃分為八區。每分地用藥量需四十%可濕性阿特靈粉一公斤。施用時把一公斤粉劑均分為八份，每份先加水少許，調成液漿，放入噴霧器後再加水二百倍，充分攪拌後，即可均勻噴撒於每一小區土面上，其他各小區土壤，用藥方法均同。這種防治法，除防甘諸地下害蟲外，還可應用於防治其他旱地作物土壤害蟲，例如豆類、玉米、蔬菜等。

在蔬菜方面較嚴重的有斜紋夜盜蟲，此蟲對主要冬季蔬菜都能為害。此蟲又稱黑肚蟲，化蛹於離地面一—二寸深處，初齡幼蟲常數百隻聚集一處為害葉背，防治可用六十四·五%「大必隆」乳劑一千倍液噴殺幼蟲。

地下害蟲除了為害作物外，還會為害房屋，畜舍等建築物，譬如以白蟻來說吧。

在本省為害房屋之白蟻約有三種其中以家白蟻最普遍而嚴重，在防治上也較困難，因白蟻巢多建造在地下或天花板上較陰濕的地方，一般防治僅能達到治標目的，無法徹底防治，如果有良好的經驗人員能找到其建造之巢穴，將其灌藥破除則效果良好。一般所用的灌注及噴洒農藥有BHC、阿特靈、地特靈等。將地特靈稀釋成〇·五%，鑽孔灌注及表面噴射，以保護地基有良好的效果。如果能找到對白蟻有防治經驗的技術人員，加以現場指導，防治效力可事半功倍。

註：嘉義縣中埔鄉和睦村七號沈海金，屏東市台糖街三巷三十號翁光雄等位農友來信詢問有關地下害蟲，請參考。