

# 茶 花

• 楊 紹 溥 •

台灣茶花的主要品種有早春、白寶塔、紅牡丹、觀音茶、廣東粉、朝鮮茶、雙瓣茶、白六角、三合會、玫瑰茶、九曲、白雪等三十餘種。茶花的栽植月份是十一月至三月。開花月份是十一月至翌年三月。花色有潔白、白、桃紅、粉紅、紫紅、朱紅、鮮紅等。茶花的姿態高雅，花朵細嫩大小適中，適於庭園及切花用。繁殖可用扦插法。

## 茶花是否需要摘蕾

茶花的花蕾，是着生於枝條的端或第二第三葉的葉腋部分，其頂

花蕾數，因品種間的不同，着生之花蕾數以二、三枚者為普通，有時其着生花蕾數亦有四、五枚以上者，因此，欲使茶花開花大而美麗則須需施行摘蕾工作，但茶花的花芽形成是在六月，花蕾形成又因種及品種的不同甚不一致，所以其摘蕾（疏蕾）之時間很難確定，不過一般情形下，當茶花蕾之生長，達如大豆般大小時，即是除蕾的最好時期，其摘蕾技術，是將集中一處着生的二個或二個以上的花蕾摘除，留一個較強健的花蕾。若在一枝條上結有二個或二個以上之花蕾時，亦同樣摘除使成一個花蕾。

栽培茶花需使全株均衛生長，並保持花蕾之平均分布，當年如不保留花蕾之枝條，則次年一定會分化花芽，而花蕾保留過多之枝條，則因養分不足，有礙來年生育。

## 茶花是否需要修剪


茶花的栽培，因其生育較慢，一般常不施行修剪，不過如為保持樹形之均衡時，亦應如其他花木一樣加以適度修剪，始能達到植株生長優美之目的，修剪於花落後施行。

## 栽培管理注意事項


茶花栽培首應着重澆水。茶花類以少量澆水為宜，但是每次之澆水量則需給以適量。盆栽茶花之澆水，在初換盆後需常加澆水，使呈黏泥狀程度，但經一段時間後，需減少澆水，否則盆內之土經常潮濕，易引起樹根腐爛或花蕾掉落。若過於乾燥，則茶花植株生育不良。

當茶花之新芽發齊後，可稍微減少澆水在此時期若澆水過多時，會促進新稍徒長，有礙盆栽植株樹姿美觀。五月初以前若稍減少澆水，可使植株節間緊密，這在茶花盆栽技術上，佔有重要意義。澆水用水以雨水最好，所以平時要設法儲存雨水，以供澆水。其次則為池沼湖澤的水，也可作茶花澆水用。

茶花是名貴花種之一，若施肥不當，則常導至病蟲為害，或枯死甚為可惜。茶花所施肥料可用大豆粉、麻油粕及茶油粕等，此外需加過磷酸石灰、骨粉和氯化鉀、草木灰等鉀肥。所施用氮、磷、鉀三要素之比約五比三比二為宜。



白雪茶花



西瓜(瓜類)：蔓割病、蔓枯病、苗立枯病。  
蕃茄·茄子：青枯病、苗核病、苗立枯病。  
菸草：猝倒病(舞病)、立枯病。  
蔬菜類：苗立枯病，紫紋羽病。  
果樹花卉苗木及其他作物之土壤病害。麻竹細菌性萎凋病。



新土壤殺菌特效藥

# 施美農

シミルトン 乳劑

經銷處：裕隆商行 台中市建國路一六七號



三共株式会社

日本東京都中央區銀座3の2

總代理 中國化學製藥股份有限公司

台北市襄陽路23號 電話：333137