

# 農友經驗



## 用竹筒捕捉蟬螂

蟬螂很怕光線，常躲在黑暗的地方。對於食物的嗅覺非常靈敏，爬行頗快，很難捕捉。  
我家注的是舊樓，不但廚房、廁所裏蟬螂多，就是浴室和寢室也經常

有牠們的蹤跡。飯菜不蓋好，便會被牠們光臨。放着的衣服亦常被咬了一些小洞。雖然我也曾購買過殺蟲劑，四處噴洒，但是殺效一時，過了一段時日，又繁殖起來。況且噴洒藥水，往往有毒性，可能影響健康。

最近我發覺有一種很簡便的捕捉蟬螂的方法，可以將牠們一網打盡，而且不需要任何藥物。方法是：準備約一尺長的竹筒一個，一端有節的，直徑約一寸，將其中置少許食物，把

## 如何檢查孵卵

檢查孵卵，雖然是一件麻煩又費時的事，但却是我們養雞必經的手續。每次必須按時詳細檢查，才能減少損失。現在將我所用的簡易方法，提供大家做參考：

它放在蟬螂每天必經之處。第二天就可以捉到許多，使用幾晚，蟬螂撲滅了許多。這是一種又經濟又簡便的方法，讀者們不妨試一試。（台南縣麻豆鎮與中路五十五巷二號曾國成）

：蔗諸同時種植，是改良法與一般舊法的不同地方。

蔗蔗共生期間管理上的要點有：

- (1) 做好整地及整畦工作，同時施用基肥，每甲用蔗作複合肥料三百公斤，堆厩肥五萬公斤以上，並施用防治地下害蟲之二·五%阿特靈粉劑二包(五十公斤)。
- (2) 蔗蔗在種植二個月後開始進入蔗溝，此時要隨時注意翻蔓工作，可增大蔗塊。
- (3) 幼蔗管理，補植要早，要徹底。發芽後注意排水去苗上過厚的蓋土，以增加幼蔗的分蘗。中耕除草及施用第二次甘蔗肥料時期要適當。幼蔗分蘗有六、七株時，株心入土一次。

## 秋植蔗園如何間作甘藷

我種植秋植甘蔗五分地，甘藷五分地。想以間作方式來增加單位面積總收益，首先要特別注意間作時期的配合問題。因為每甲秋植甘蔗比春植甘蔗產量高，收益亦穩定可靠。同時甘藷的收穫時期，正符合都市裡冬天「燒甘藷」之需要，價錢最好。

秋植蔗園間作甘藷，一般的舊方法是先諸後蔗，這種舊法有許多缺點。如甘蔗由於甘藷間作的影響，幼蔗分蘗少，鼠蟲害增加，因此產量大減。舊的方法又較費工花錢，假使應用諸蔗同時種的改良法來間作，就可免除這些缺點，不過須徹底執行幾點重要的作業。


(1) 選用適當的甘藷、甘蔗品種：

台農五十七號甘藷蔓短，成熟早，對甘蔗產量影響較輕，同時每甲產量高，且食味甜美，營養豐富，頗合燒甘藷的市面需要。甘蔗品種用F一四六最好。

(2) 間作時期的配合，是決定此項間作栽培的重點

「燒甘藷」因蔗塊外形要求很嚴，過去我曾遇到蔗塊被地下害蟲食害，致無法作燒甘藷之用，損失頗大。事後由於區農會及糖廠輔導，於施用基肥同時，施用二·五%阿特靈粉劑，防治地下害蟲，解決了這個問題。

大肚山西麓的埤水地帶，由於天然環境較差，過去農友們雖然耕地面積大，但作物的生產收益很差，農家生活無法改善。現在假使各位能多採用今天我所介紹的既經濟又實用的改良方法，利用秋植蔗園間作甘藷的話，必定能增加收成，改善生活。（台中市西屯區協和蔗作共同經營班林德生）



高雄縣湖內鄉湖內村示範農家孫明德農友飼養的蛋雞，共有一千多隻。左圖為他檢拾雞蛋情形。（許宗榮）

(一) 孵卵到一星期時，必須行第一次的檢查。就在燈光下，左手持卵，右手攔在卵的頂端遮光，卵對人的半面就格外黑暗，查看遮暗處的卵，即可透見卵的內容，如果卵透明如未孵前一樣，這是未受精的卵。如為黃暗而無血絲隱約其間以及暗色斑點的，這都是死卵，這種卵應立即除掉。如內容鮮明作橙紅色，有紅色的血脈網絡於其中的，是健全的好卵，檢查好後，仍須放入巢內。

(二) 孵到二星期後，應行第二次檢查，這時如見到內容有血絲聯成一片或昏暗不明或混濁不清或血色發黑，這都是死卵，應立即棄掉。自此三星期後，小雞就破殼而出。（宜蘭縣蘇澳鎮新城北路九號之一賴惠珠）