



菜蔬

白殼冬瓜耐貯藏

【問】：(一)冬瓜有那些品種，何種較好？
(二)何時播種最適，幾天後可收成？
(三)主要病蟲害有那些？
(四)栽培上應注意什麼？(台北縣萬里國中林山坪)

【答】：(一)依栽培目的，可分三種(白殼大冬瓜)適於貯藏與加工及青殼長冬瓜適於蔬食用，但不耐貯藏。故一般栽培白殼大冬瓜為多。
(二)北部二一三月為播種適期，南部八月至翌年一月為播種適期。
(三)播種後一百二十天左右可採收。
(四)主要病害，有炭疽病、疫病、白粉病、青枯病，主要害蟲有守瓜及瓜實蠹、蚜蟲及蟋蟀等。
(五)蜜蜂活動較少時，宜行人工授粉，但不可擦傷雌花及茸。(王進生)

福特好短性菜豆

宜在三月中播種

【問】：(一)矮性菜豆，南部地區是否可播種？
(二)種子何處有售？
(三)矮性菜豆種子，每公斤價格多少？
(四)遠處是否郵購？

【問】：(一)菜豆春播要播何品種？(高雄縣彌陀村一七九號蘇勝隆、台南仁德土庫村二〇六號進同)
(二)矮性菜豆，在南部地區可以播種。
(三)種子可向本省較大而信用卓著之種苗店購買。
(四)矮性菜豆種子價格，每公斤約五十五元左右。
(五)較大種苗店，大多可以郵購。
(六)春秋作皆可播種「福特好」品種。(高瑋瑛)

草莓定植後 八十天收成

【問】：(一)草莓有那些優良品種？
(二)草莓何時栽植，定植後多久可收成？
(三)如何繁殖，種苗何處有？
(四)本地可否栽培，每分地需苗若干？
(五)所需氣溫及栽培要點如何？
(六)花蓮縣壽豐鄉半裡村一九六號徐燕廷)



【答】：(一)草莓優良品種有馬歇爾、幸玉、紅鶴及福羽等。
(二)草莓栽植適期，北中部為十月至二月，南部十一月至二月中旬。定植後七十至八十天可收成。
(三)草莓是用苗繁殖的。繁殖方法是在六月上旬結束採果以後，仍將母株留在田間生長，使匍匐枝繼續生長，匍匐枝發生後，還會再生匍匐枝出生第二苗。在九月挖取苗，集中育苗至十一月下旬定植。草莓苗可向苗栗縣大湖鄉農會洽購。
(四)在花蓮地區可以栽培草莓。每十公畝約六千苗，去年每苗約〇.一五元。
(五)定植以後需要涼快氣溫，在採收期間(二月下旬至六月上旬)雨多，會使果實腐爛。至於栽培法，詳請參閱本刊十八卷二十二、二十四期。(陳培昌)

樹果

二年生酸楊桃 可供甜種嫁接

【問】：(一)嫁接甜種楊桃用的酸種楊桃苗，如何大量繁殖？
(二)甜楊桃繁殖，用取木法是否可以？(台北縣三芝鄉埔尾村埔尾街二號)

【答】：楊桃嫁接，先需培育砧木，砧木可用酸楊桃之種子播種育苗，一年生者嫌小，最好採用二年生苗。
(二)優良之甜楊桃亦可用壓條法(亦稱剝枝或取木)繁殖，低處分枝可用普通壓條法，高處分枝可用空中壓條法，處理合適，均可發根成苗。(黃錫臣)

鳳梨即是酪梨 三月定植最好

【問】：(一)鳳梨是何種梨，適於何地栽培，怎樣繁殖？
(二)橫山梨介殼蟲為害，如何防治？(卓蘭鎮十八鄰老庄里一五六號鄭中典、台中后里安厝路二一號張秋章)

【答】：(一)鳳梨「又稱為酪梨，是熱帶果樹，可於本省海拔五百公尺以下坡地栽培，於三、四月間定植為宜。用種子繁殖易變種，最好選優良品種行接木，有關種子請向嘉義市山子頂嘉義農業試驗所查詢函索。
(二)橫山梨介殼蟲防治法有：(1)落葉期，用九十五%高級夏油九十五倍。(2)生育期，用五十%大滅速乳劑五百一十千倍。(李信芳)

柑桔冬季摘花 迎春花數正常

【問】：(一)柑桔去年冬季開花經摘花後，今年秋季花又盛開，若再摘去是否會影響來年春季的開花結果？
(二)柑桔開花摘花，何種較好？(左營緯三路合群里一八七號黃震雲、新營中山路一六〇號張耀仁)

【答】：(一)柑桔一到開花結果時或有開花能力時，若摘去春季所開之所有花朵，而春、夏稍生長不旺盛時，即易引起秋花之

●原料自日本進口！

最好綠 NO2

台灣省農林廳登記農肥字第011號

BEST GREEN

通用農作物：果樹類、蔬菜類、花卉、茶葉、藥劑省錢

使用濃度：1000倍 比其他的藥劑省錢

最好綠是：促使農作物迅速茁壯成長成熟之最佳植物營養劑！

興達化工廠出品