

空氣傳染：由於空氣的流動，病原體附於塵埃上隨風飄浮而傳染，一般來說，在五百碼內，空氣有傳播本病的能力。

種蛋傳染：本病病原體可寄生在種蛋內而傳染給下一代，此種情形在氣囊型比較多。病原體由種蛋傳染的數目並不多，但一批內有一兩個初生雞帶有病原體，就可傳染整籠的火雞雛。若想防止本病的傳染，就必需根絕由種蛋傳染的徑路。

此外由於工作人員或器具，都可傳染本病。

本病的預防，除一般衛生工作要徹底實施外，並注意下列幾點：

(1) 嚴禁火雞與雞或玩禽禽類接近。以防止由雞為媒介把病原體傳給火雞。

(2) 不同年齡的火雞要分開飼養，發生過本病復原的火雞，尤應隔離單獨飼養。

(3) 以統進統出之方式飼養種雞或肉用火雞，雞舍休閒時間應徹底消毒，包括床架、地面、牆壁以及用器。並盡量保持火雞舍清潔與乾燥。

(4) 從衛生良好，無鼻竇炎傳染的雞場購進火雞雛。新購進火雞要單獨隔離飼養詳細觀察三十天，可能的話再驗血，看看有否感染本病，若已感染鼻竇炎就不能再留為種用。並小心防止傳染給健康火雞。

(5) 種用火雞應定期抽樣驗血，感染本病的火雞應淘汰列為肉用，以阻止本病由種蛋傳給下一代。

火雞發生本病時，可用下列方藥品治療：

硝酸銀：使用前將硝酸銀配製成百分之四的溶液，然後把鼻腔中粘液擠出，而後每一鼻腔內打入一西四分之四的硝酸銀，二至三天後腫脹即會消退，要十天以後才能完全好。用藥量不能超過一西四，否則會傷害鼻腔內的組織。使用者要小心，最好帶手套，因硝酸銀藥性很烈。

抗生素：把鼻腔內粘液排掉後，每一鼻腔內打進連德素二十五毫克或土徽素十毫克，在一至二星期內可以治癒。

「泰農」及「富拉多利頓」(NE-180)，對本病也有很好的效果。

白菊·杭菊

●李阿來●

●白菊與杭菊都是菊花品種，兩種花乾都可以開水沖泡飲用，代替茶葉或與茶葉混用。

●調製法是以日光曬乾，完全沒有水份才可以貯存。

●菊花乾中藥店有售，據說有清涼、瀉火等藥效。

●台南縣後壁鄉嘉麥村一一八號邱玉書農友問菊花泡茶，請參考。

牌子老日產★農藥成份確實

五七年水稻二化螟蟲試驗成績第一
殺蟲範圍廣，可收綜合防治功用
殺蟲力強、毒性輕微、速効性的
水稻、果樹、蔬菜綜合殺蟲劑。

註冊商標

益農產乳劑

エルサン50%

藥力強、殘効性期長、
最適合水稻、果樹害蟲之驅除

註冊商標

心愛用乳劑

PIN 45%

紋穗液劑

水稻紋枯病特效藥

大生精液劑

園藝蔬菜病害殺菌劑

大滅蟲乳劑

蔬菜害蟲專用殺蟲劑

窒素、生長素，微量要素混合營養肥料
用少量而有效一葉面散佈劑。

荷蒙綠

災害後之衰弱，葉面黃化或硬化，欠肥
或施肥過量的生理障害症，調節產期，
提高品質，防止隔年結實。

包包檢驗局檢驗合格
包包立有成份保證票

中日技術合作 台灣日產化工股份有限公司 電話：771348
台北市內湖區安康路140號 710516