



早田密植葡萄

每公頃三千株

【問】：(一)早田密植葡萄，以井水灌溉，如何種法，行間可否間種甜橙？

(二)何時播種，選何品種？(南投縣中寮鄉永平村初巷一號陳付)

【答】：(一)早田有井水灌溉可以栽培葡萄。密植時每公頃有三千一四千株，每二株一橫，株距二十五—三十公分，縱距五十公分，行距二百公分，中間可以間作甜橙等果樹。

(二)少量時一年四季均可栽植，大而廣的栽培最好在十二月至二月(新曆)。苗木及出售地點，請參考本刊十九卷十九期第三十八頁。(康有德)

白柚壓條不易生根

【問】：(一)白柚行空中壓條已數月，為何還不能生根？

(二)葡萄用土壤高壓繁殖與用扦插者，結果情形何者較好？(嘉義縣中埔鄉義仁村三鄰十號林宏福、劉高疆)

【答】：(一)白柚空中壓條繁殖難生不定根，塗千分之一之NAA可有促進效果。(二)用土壤高壓繁殖葡萄可以生根，其生

長情形一如扦插苗，對於生長與結實不會有差別。(康有德)

蘋果梨樹修剪 宜採低幹整枝

【問】：(一)蘋果梨樹要如何修剪？(二)蘋果樹後不發芽，隔年長出發芽後又慢慢枯死是何原因？

(三)若為病蟲害宜噴施何藥？(四)有何書籍可供參考？(台中潭子鄉聚興村潭興路十六號之三馮玉德)

【答】：(一)目前本省蘋果與梨之整枝宜採用低幹後期開心型。梨於較平坦地方更可採用棚架型整枝，修剪與施肥依樹齡及氣候、土質等略有差異，噴藥則需視實際病蟲害情形決定，這些技術問題，此處實難三言二語為您答覆，容後另文詳加解釋。

(二)蘋果不發芽根據所述，推測原因如下：(1)主幹基部有蟲害，(2)種植地區海拔太低，冬季低溫不足，影響休眠。(3)發生病害。

(三)噴藥不適或濃度過高。可試用石灰硫黃合劑七—八倍。於落葉後及發芽前各噴布一次，有預防效果。

(四)參考書籍，目前尚少中文者，日文則甚多，可逕向各大書局詢問。(李信芳)

六月梨即橫山梨 宜在一、二月種植

【問】：(一)有一種適於高屏地區之梨樹，六月產果，請問此種梨樹之學名？

(二)此樹適於冬休眠期種植，請問植後是否需要澆水？

(三)栽此果樹，可間作何種作物？(高屏旗山鎮旗東路三十號黃瑞華)

【答】：(一)所言「梨樹」，是否為「梨樹」，或是「李樹」？若為「梨樹」，則「六月梨」即為「橫山梨」，學名統稱為砂梨(Pyrus Serotina Benth.)。

(二)不論何種樹木於何時種植，定植後均宜即時充分澆水一次，可確保成活率。梨於一—二月間完全休眠期種植，若完全無法澆水，但土壤不完全乾燥，亦有成活希望。

(三)梨為多年生果樹，在幼年期間，行株距離甚寬大，可間作短期農作物或其他矮性花卉蔬菜或結果年壽命較短之果樹均可，總以不妨礙主作物之生長為原則。(李信芳)

草魚浮頭現象 魚池缺氧所致

【問】：(一)鱧魚及草魚為何常會浮於水面？

(二)飼養泥鰍與土虱之水池，環境需要如何？

(三)養殖泥鰍與土虱有利嗎？此兩種魚之主要飼料有那些？

(四)如用花生餅或者雞糞作飼料那種比較好？(台中市北屯區同榮里同榮巷四號江鴻錡)

【答】：(一)鱧魚和草魚喜棲息在水之表層屬上層魚類，如果不是在日出以前魚兒羣起浮游在水面用口來吸取空氣而呈現浮頭現象一即表示池水中缺乏氧氣。

(二)泥鰍(鰕)與土虱之飼養池，池底需富含有機質，也就是池底要有淤泥，堤岸必需堅固以防逃逸，因為這兩種魚習性喜穿孔。

(三)泥鰍和土虱目前還沒有有人養殖是否有利無法奉答，此兩種魚主要飼料是天然的微生物。

(四)花生粕可以作為人工飼料，雞糞是屬於肥料利用。雞糞中含有的有機肥分可使池水中的微生物(浮游生物)繁殖作為天然飼料。(吳榮藩)

高雄二號稻種 一期作全省可種

【問】：嘉義地區一期作是否可種「高雄二號」？

(二)高雄二號之稻種，何處有售？

(三)高雄區農業改良場地址在何處，洽購手續及價格如何？(嘉義市下埤里鳥岫仔五鄰十二號蕭誠一)

【答】：(一)高雄二號是適應性甚廣的品種，一期作全省均可栽種，但二期作因

原料自日本進口！

最好綠 NO2

台灣省政府農林廳登記農肥字第011號

BEST GREEN

興達化工廠出品

使用濃度 1000倍 比其他的藥劑省錢

通用農作物 瓜 果 樹 類 蔬菜 茶 葉 藥 劑 省 錢

最好綠是：促使農作物迅速茁長成熟之最植物營養劑！