

聖誕紅——張瑞卿——



盛開的聖誕紅 (張榕操)

聖誕紅又名聖誕花或向陽紅，花為腥紅色，葉是鮮油綠色，卵圓型盾狀，邊緣有稜角。主脈紅色，花和葉都非常美麗，具有觀賞價值。花期很長，從十二月到次年二月開花。聖誕節(十二月二十五日)前後盛開，可以作新舊曆年節裝飾、盆景和插花的好材料，用來點綴年景。

適地：主要向陽地方，排水良好，有腐植土就可以栽培，並不需要特別管理。全省各地可以種，關子嶺地方種的最多，外銷盆栽也頗有希望。

繁殖：用枝條扦插，扦插苗要在花葉開始凋謝時，選擇上年生黃褐色強壯枝條作插穗。二至四月插枝，扦插後約十個月就會開花。依枝條節間的長短，剪成二十公分左右長的短枝為插穗。

插穗須附有二至四芽，一端斜切以便插種。


如果用木箱或花盆少量繁殖的，每株間距離六至九公分。苗圃大量繁殖時，先作出床，株間一五至二〇公分。扦插的時候先用小竹或小木桿，在土壤裏鑽一個洞。再將插穗斜插入土中三分之二，離地面露出一根芽。栽種時用手壓緊土壤，使土壤和插穗密切接合，才容易成活，發芽抽枝成幼苗。

移植：在苗圃裏繁殖的苗木，六月中旬即可移植到花盆或庭園。移植時應將過長的根剪去一部分，使多生鬚根。苗的上部，看生長情形，自基部三至五芽處剪去。

施肥：聖誕紅很容易活着，不需多施肥料。但為促進開花，開花以前可施花草肥料或少量硫酸銨一二次。施肥前先除雜草，翻鬆土壤。肥料不要接觸葉面。移植庭園中的聖誕紅，可以在植穴下面，用腐熟堆肥或厩肥半公升墊好，再在上面覆土。定植時，注意不要使肥料和幼苗根直接接觸，以免腐爛枯死。以後每隔二個月，在植株周圍掘淺溝，施少量肥分，再覆蓋灌水。

修剪：要使樹形姿態美觀，從栽植到開花以後，共需修剪三次。

第一次：幼苗移植時，修剪枝葉和根部。第二次定植二至



西瓜(瓜類)：蔓割病、蔓枯病、苗立枯病。
蕃茄·茄子：青枯病、菌核病、苗立枯病。
菸草：猝倒病(猝病)、立枯病。
蔬菜類：苗立枯病、紫紋羽病。
果樹花卉苗木及其他作物之土壤病害。蘇竹細菌性萎凋病。



新土壤殺菌特效藥

施美農

シミルトン 乳劑

經銷處：裕隆商行 台中市建國路一六七號



三共株式会社

日本東京都中央區銀座3の2

總代理

中國化學製藥股份有限公司

台北市襄陽路23號 電話：333137