


TOK[®] 多谷[®] 粒劑

一分地一期 1包3公斤 (不二價新台幣85元)
(一期作只用一次)

免 擱草 · 好收成



最安全
最有力的強力水田殺草劑
(稗仔、粵菜、三角草、牛毛氈等)

附註	項 事 意 注	持 保 水 田	期 適 藥 施	作 工 備 準
附註：請向多谷粒劑經銷特約店購買 (認明上圖為特約店標誌)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 避免施藥層被破壞再生雜草，施藥後12天內勿下田工作。 2. 軟弱秧苗積水勿超過葉舌，以免葉害之虞。 3. 晨露或雨後葉面未乾易引起藥害，應俟乾燥後施用。 4. 無水田或漏水嚴重田，(一次灌水不能保持三天以上) 則應改用思登34除草劑。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥前田水應積三、五公分，(按土壤種類予增減水深)。 2. 施藥後應保持五天土不浮出水面。 3. 施藥三天後缺水，可徐徐補充不足水分。 4. 下雨時應留有葉舌高之排水口，以防稻株被浸過高影響葉部發育。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第一期作插秧後五、七天。 2. 第二期作插秧後三、五天。 3. 以上適用期均以整地日算起。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 糊補畦畔之漏洞，減免施藥後灌溉水之流失。 2. 整地力求平坦以保持同一水深。 3. 應施用基肥以促進水稻初期生育。 4. 施藥前應先檢除田面雜草。

ROHM 美國羅門哈斯公司 供應
HAAS 青象貿易股份有限公司 代理



台灣正豐化學股份有限公司 出品
台中縣霧峯鄉民生路103號 電話：63·163號