


TOK® 多谷® 粒劑

免 撒草 · 好收成



最安全
最有效的強力水田殺草劑
(稗仔、學菜、三角草、牛毛氈等)

一分地一期1包3公斤(不二價新台幣85元)
(一期作只用一次)

附註	項 事 意 注	持 保 水 田	期適藥施	作 工 備 準
附註：請向多谷粒劑經銷特約店購買 (認明上圖為特約店標誌)	1. 避免施藥層被破壞再生雜草，施藥後12天內勿下田工作。 2. 軟弱秧苗積水勿超過葉舌，以免葉害之虞。 3. 晨露或雨後葉面未乾易引起葉害，應俟乾燥後施用。 4. 無水田或漏水嚴重田，(一次灌水不能保持三天以上)則應改用思登34除草劑。	1. 施藥前田水應積三—五公分，(按土壤種類予增減水深)。 2. 施藥後應保持五天土不浮出水面。 3. 施藥三天後缺水，可徐徐補充不足水分。 4. 下雨時應留有葉舌高之排水口，以防稻株被浸過高影響藥部發育。	1. 第一期作插秧後五—七天。 2. 第二期作插秧後三—五天。 3. 以上適用期均以整地日算起。	1. 糊補畦畔之漏洞，減免施藥後灌溉水之流失。 2. 整地力求平坦以保持同一水深。 3. 應施用基肥以促進水稻初期生育。 4. 施藥前應先檢除田面雜草。



ROHM HAAS 美國羅門哈斯公司 供應
青象貿易股份有限公司 代理



台灣正豐化學股份有限公司 出品

台中縣霧峯鄉民生路103號 電話：63・163號