



農業信箱

鳥梨可作梨砧木

〔問〕：(一)據聞台灣二號水梨砧木，是台灣大學引進的新品種，請問何處有售？(二)台中縣霧峯鄉四德路二之三一號田台榮)

〔答〕：梨的砧木都使用本省野生種「鳥梨」，大致分「有刺」及「無刺」兩個系統。對橫山梨、日本梨或西洋梨，在目前都非常適應，惟尚未聽過有「二號砧木」，既然您聽說由台灣大學引進新品種，不妨直接向該校園藝系洽詢。(李信芳)

蘋果園管理

〔問〕：(一)蘋果和梨如何剪枝、

施肥(施何種肥料較好)及病蟲害防治？(二)去年春天，所有蘋果中只有一株很久不發芽，但後來雖然發出一點點芽，却又慢慢乾掉了，以後枝條隨着也乾枯，最後又從主幹上生出新芽，而且很正當。請問這是何種病蟲害？(台中縣潭子鄉聚興村潭興路十六之三號馮玉德)

〔答〕：(一)梨樹栽培法，請向農林廳索閱推廣手冊，蘋果栽培原則上亦可參照該手冊實施。惟蘋果宜採用變則主幹，或後期開心型整枝，較少採用棚架整枝；修剪則依樹齡及枝條種類略異，以疏刪修剪為主。施肥應視土質以有機肥為主，於冬季施入，酌加化學肥料，可作追肥的用途。蘋果病害，目前以白粉病及黑點病較嚴重，其他不下十來種，不論何種病害，至少落葉期間噴佈數次石灰硫黃混合劑，有預防的功効。

(二)所述蘋果枯死的原因，主要為(一)黑點介殼蟲：可噴射○●○五(二)赤衣病：(三)所述病狀是受黑點介殼蟲及赤衣病為害，如為害延至葉柄時，可使葉片脫落。今將防治方法介紹如下：

柳橙病蟲害 除枝施藥防治

〔問〕：(一)柳橙單枝或整棵葉片先呈捲曲狀，然後慢慢脫落，此為何種病害？應如何防治？(欠水情況不嚴重，每株均用三株廣東檸檬作三角形根接)

〔答〕：(一)葉脈先呈黃色而後落葉，發育亦受阻，是否為立枯病？(植地排水良好)應如何防治？(嘉義縣竹崎鄉紫雲村坑口二七號蕭瑞呈)

香蕉葉斑病防治

〔問〕：依照青果合作社規定，以礦物油、「自來通」和「大生二二或四五」粉三種藥劑，混合用於香蕉葉斑病的防治。夏季施藥時常遇雨水，請問施藥後幾小時開始發生殺菌作用？又幾小時後始可完全殺菌？(施藥均勻狀況下)(屏東縣新埤鄉打鐵村東興路五號會照宿)


〔答〕：礦物油等噴施後，病菌碰到馬上死亡，此藥劑中大生粉具有預防作用，而礦物油對感病初期有治療效果。此混合藥液施用後，能保持效果很久，不過對剛新長出的葉子就無效了，所以施藥次數要看新葉出現速度而定。(蘇鴻基)

ROHM AND HAAS
PHILADELPHIA
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19105 USA



*
大生
四十五

(DITHANE* M-45)



農藥登記證第七二二號
三磅紙袋原裝

■現貨供應■

民豐化工股份有限公司

台中縣大肚鄉中和村中山路10~6號
電話：島日局一〇六號

台灣總代理：

青象貿易有限公司

台北市漢口街壹段壹肆肆號柒壹壹室
電話：三三六一七七

◎說明書函索即寄

*美國賓州費城羅門哈斯公司
登記商標