

訪李來三農友談

麻芝茄子的栽培法

二崙鄉農會廖萬裕

本省茄子的種類很多，唯一年四季都能夠栽培的並不多，本鄉（雲林縣二崙鄉）大義村李來三農友父子經過多年苦心研究育成理想一號、二號及改良麻芝茄。

該種麻芝茄雌雄花都會結果，茄果為烏紫金色，色緻美觀。果肉甜香柔軟，子少，在市場上極受歡迎。栽培不受季節的限制，四季均宜栽培，定植後一尺左右就能開花結果，每隔二葉或一葉即結果一次。現將李農友栽培經驗敘述於後，以供有意栽培農友參考：

(一)育苗：茄子於採收選種後二個月內為休眠期，在休眠期間下種的其發芽率僅十五%—三十%左右，若在休眠期過後攝氏溫度二十度至三十二度時播種的，其發芽率可高達八十七%以上。但在休眠期間若緊急下種時，可將正在休眠中的種子放進電冰箱四十八小時後取出再下種，其發芽率約有七十%左右。

苗床須選擇排水良好及土質肥沃



李來三農友和他所種的茄子

鬆軟的濕潤地。整地時一坪地施下堆肥十五台斤，過磷酸鈣一·五台斤，尿素半台斤，氯化鉀一·五台斤與土壤充分混合。

整地後三—四天才下種，下種前將種子浸水一天後混些砂土播種較為平均。如溫度在攝氏二十五度以上時，種子即不用浸水。

茄子播種後用安特靈乳劑六百倍液噴射一次，預防幼苗蟲害，然後在畦面加蓋堆肥或稻草，每日早晚各洒水乙次促進發芽。

育苗期間如遇兩期或嚴霜季節，最好能使用PE塑膠網覆蓋，唯溫度在攝氏二十五度以上時應把PE網拉開，以使植株充分接受陽光。

(二)土質選擇及定植：茄子播種後夏秋三十五天、冬春四十五天可行定植，定植園地須選擇排水良好的肥沃土壤。因發育不

佳且產量低，粘質土因乾濕相差極大，很容易發生病蟲害均不宜栽種。


若須在砂土地方栽培，其施肥及澆水量均須較水田多。整地後作成畦，每畦寬四台尺，畦溝深、寬各一尺，每畦栽種一行，株距一·六台尺。

(三)澆水：活著後每周至少畦溝灌溉一次，至離畦面二寸時即行排水，使水分自然濕潤於畦面，以後亦需時常保持畦溝的濕度，不可過份乾燥，以致影響產量及茄株的發育。

(四)施肥：夏秋定植後十天，冬春定植後十二天行第一次追肥，首次施肥約離茄株四寸左右掘穴，每分地以硫酸銨四十公斤、過磷酸鈣五十公斤、氯化鉀四十公斤混合後施於穴內，然後覆土，避免陽光照射。第一次追肥過後十天再以每桶人畜糞原加入一碗尿素混合後施於株旁，以後視茄株的發育情形酌以施用，方法與第二次追肥同，均以尿素為主，開花期如著果率差時可補充些過磷酸鈣，唯在結果期需減少使用，以免影響茄果品質與色澤的美觀。

(五)整枝與支柱：整枝即將第一花架下的側枝全部摘除，其餘側枝可全部留著，側枝後在株邊立支柱並用稻草將茄株固定於支柱以防動搖擦傷茄果，影響美觀及品質。結果前並在畦的兩端，茄株的兩旁各立支柱，上面架以細竹或鉛線，結果後將茄果揀放於細竹上。(如下附圖)

(六)病蟲害防治：苗床時可於下種後噴射安特靈乳劑防治各種蟲害或在整地同時撒布飛布達粉劑。定植後如有蚜蟲發生



麻芝茄的整枝和支柱

宜噴射馬拉松乳劑八百倍液防治，小綠浮塵子噴射賽文八百倍液防治，紅蜘蛛用開路生可濕性粉劑五百倍液防治，褐紋病、綿疫病噴射大七生十八可濕性粉劑四百倍液防治。

(七)採收：開花後二十五天即有茄果可收，初期每隔三—四天採收一次，盛產期約隔一天可收一次，採收以下午最適，晚上將採收的茄子包裝好後放置屋外吸收露水，翌晨可增加茄果的光澤與美觀，並趕上市場銷售。在採收至五個月左右，視茄株發育及產量情形，可在主幹一尺之處剪除及除去幼枝，然後加重施肥、澆水，五十天後可大量採收。(如要該項麻芝茄農友，可向二崙鄉農會推廣股或大義村刺仔圍一號之一李來三農友接洽即可)

農友經驗

