

農業信箱



荔枝黑葉品種

中南部適宜栽植


〔問〕：(一)嘉南地區是否適合栽植荔枝？何時栽植為宜？
(二)現在有幾種品種？那一種較好？那裏有賣？


〔答〕：(一)栽植距離、管理方法以及病蟲害的預防如何？
(二)栽植荔枝的初期，是否適合間植短期果樹？何種果樹適合？(苗栗縣竹北鄉大義村后面三二號陳進發)

〔答〕：(一)本省新竹以南地區，都很適合栽培荔枝，而以新竹至台中一帶最理想。

南部因為冬季氣溫較高，凡土壤

壹公斤法國原裝



真正的大生英文是“DITHANE”務請認明商標  才是品質可靠的標誌

口進新裝原
八十七生大*

農林廳農藥登記證第五八九號

*大生三十二(DITHANE M-22)



壹公斤法國原裝

(農林廳登記農藥字第517號)

現貨進口經銷商：
一、裕泰公司 彰化廠：彰化市和平里五十五號
二、惠光貿易有限公司：臺南市東門路二三一號
三、安泰公司：台北市錦州街三十三號之一、二樓
四、英明貿易有限公司：基隆市郵政信箱八六號
五、福豐公司：台北市漢口街一段五十七號二樓
青象貿易有限公司
臺北市漢口街改裝路財神號榮發號
電話：三三六一七
廣告刊費面議

水分較多的土地，容易抽生新梢，影響花芽形成，結果較不穩定。
最適各種植荔枝的時期為國曆一至二月，種植後需要充分灌水，並妥設支柱。

〔問〕：(一)台中以北至新竹地區，以發展晚熟種為理想，種苗可以向台中縣霧峯鄉萬豐村大坑巷六號林端松先生洽購。
(二)台中至嘉義一帶以發展黑葉為理想，種苗可向台南縣善化鎮農會黃秀卿先生或南投縣草屯鎮慈生醫院謝如川先生洽購。

〔答〕：(一)高雄早生混植(為理想，種苗可向屏東縣萬丹鄉萬安村萬丹路六九號張主賞先生，或屏東縣內埔鄉中林村開山路十五號之二宋維柱先生洽購。但黑葉一品種在各地栽培的生產成績，都很良好。

〔答〕：(一)栽植距離以 2×2 公尺較適當，每公頃約可種植二百株。
(二)株行間可間植其他短期作物，

或壽命較短而植株矮小的果樹，如香蕉、番石榴、番荔枝、鳳梨等。(張振宙)

柑桔線蟲化驗

注意取樣方法




〔問〕：(一)什麼地方有分析柑桔線蟲的機構？
(二)樣品土是要表土或表土以下的泥土？
(三)何時可做分析工作？
(四)是否要繳費用？
(五)一次要多少泥土？

〔答〕：(一)目前尚無專門為果農分析柑桔或其他果樹線蟲的機構，不過時常有許多農友寄柑桔樹根與土壤到高雄區農業改良場(屏東市農事巷一號)線蟲研究室化驗。他們很樂意為農友服務，但希望不要寄太多標本去，因為他們本身工作很忙。

〔答〕：(一)取樣品方法，視柑桔樹大小，大約離樹主幹二至五尺間，挖深約七、八寸處的細嫩根羣少許，以及根羣周圍的土壤約半公斤重，裝入塑膠袋內。

中川牌噴酒灌溉器·專為砂丘及坡地果園

灌溉用·噴酒均勻·省工便利·價廉實用

 <p>60型 1" 管子牙</p> <p>噴酒水壓 3kg/cm²~5kg/cm² 噴酒直徑 40m 噴酒水量 60l/min</p>	 <p>30型 3/4" 管子牙</p> <p>噴酒水壓 2kg/cm²~3.5kg/cm² 噴酒直徑 28m 噴酒水量 30l/min</p>	 <p>20型 1/2" 管子牙</p> <p>噴酒水壓 1kg/cm² 噴酒直徑 15m 噴酒水量 14.5l/min</p>
---	---	--

中川機械工廠出品 臺中縣豐原鎮西勢路三巷五號 TEL. 3751轉