

# 日東農藥

新開發

## 稻熱乳劑

最新出品新型水銀劑・水稻稻熱病尅星

### 大滅殺乳劑

稻苞蟲、青蟲特效藥

### 得納寶乳劑

紅蜘蛛特效藥

農友們！請認明信用最可靠・品質最優良的日東農藥。

### 萬利稻富特靈乳劑

新紋寶乳劑

### 大滅松乳劑

毒殺芬乳劑

### 富稻農乳劑

### 強力PM乳劑

歷史悠久・強力速效・保証豐收。

製造廠：

**日東化學股份有限公司**

地址：台北市重慶南路一段31號

電話：20770・20660

地址：三重市光復路一段26號

電話：973434

或靜脈注射在十公絲以下者。

(3) 劑物：對巒鼠急性口服 LD<sub>50</sub>，每公斤體重在三百公絲以下，或皮下注射在二百公絲以下，或靜脈注射在一百公絲以下者。

(4) 普通物：對巒鼠急性口服 LD<sub>50</sub> 每公斤體重在三百公絲以上，或皮下注射在二百公絲以上，或靜脈注射在一百公絲以上者。

(5) 美國警分標準：以老鼠(*rat*)為標準。

(1) 最毒：凡屬下列任何一種者。

① 對老鼠一次口服 LD<sub>50</sub>，每公斤體重在五十公絲或以下者。

② 對老鼠一小時內經呼吸器官入體的 LD<sub>50</sub> 在二百分之一（以空氣計算）或以下者。

③ 對老鼠在二十四小時內，經皮膚浸透入體 LD<sub>50</sub>，每公斤體重在二百公絲，或以下者。

(2) 有毒：毒性在(1)類（最毒）的十分之一者。

(3) 稍毒：毒性在(2)類（有毒）的十分之一者。

(4) 較無危險性：指不屬上述三類者。

### 注意殘毒・不可濫用

我們都知道農藥多數含有毒性，不但在施用時有危險，而在使用後，其毒性殘留在土壤植物體上，也有被吸入植物體內，或果實種子內，必須經過一段相當時間，才會逐漸消失，而其消失的快慢即

殘毒的長短，常因農藥的種類、成分、使用濃度、使用時及使用後的氣候，使用作物的對象等而有所

不同。因此目前一些先進國家，由於有良好的殘毒分析設備，對農藥的殘毒長短，規定有採收安全期

及殘毒「容許量」，其中美國糧食藥品管理局(FDA)的規定，是為目前各國所採用參考的。我國

對農藥的殘毒及安全採收期，也多數根據美國的規定。我國對蔬菜及茶葉的用藥有較嚴格的限制，如

二氯松(DDVP)、乃力松(大必隆<sup>®</sup>)、馬拉松(Malathion)、尼殺松(Nexon)等，

規定施藥後四天才可採收。加保利(賽文<sup>®</sup>)、鋅乃浦、錳乃浦、銻乃浦、免特爛、白粉克等，

七天才可採收，撲滅松(速滅松<sup>®</sup> Sumithion, Fenthion)等，十天才可採收。大利農(Diazinon)十四天才可採收。賽達松(益農產 Elsan, Cidial)十五天才可採收。安殺番(殺蟲淨 Thiodan)二十天才可採收。

(未完・待續)

### 三品種雜交豬

#### 生長快利潤高

藍瑞斯×大型約克夏(大白豬)雜交母豬，配杜洛克種公豬產生的三品種肉豬，在目前似乎是最好的方法之一。這種繁殖方法，可使生產率高，體質強健，且生長迅速。如果飼料有適當管理，在六月內可達九十公斤以上，因此生產成本低利潤高，並可適合內外銷要求。

另外藍瑞斯、杜洛克的雜交母豬配大白種公豬，也可得到同樣效果。(張聯欣)