

海棠栽培



為簡單安全。

(一) 扦插時期：以二至三月，九至十一月為宜。

培養土調製法：

(一) 腐葉土三分，堆肥三分，田土四分。

(二) 腐葉土四分，堆肥四分，牛糞二分。

(三) 腐葉土五分，田土四分，砂一分。

培養土中可加入少許石灰，中和酸性，使酸度 (pH) 為六·二至六·六。

栽培：注意溫濕度與光線的調節，適當施肥。

(一) 溫度十八度C至二十五度C為適溫。三十度C以上，十五度C以下，發育不良。三五度C以上，五度C以下，生長停止。

(二) 澆水與濕度：海棠根淺，根羣細小，所以水分不可缺少，但必須注意排水良好。夏天應注意通風，在高溫多濕情況下，最易腐爛。

夏季每天澆水一次，冬季兩三天一次，最好在早晨澆水，除雨天少給水分。

(三) 光線：一般不喜直射光線，必須遮蔭，強烈光線會使葉子的顏色變黃或燒焦。四季海棠、木立海棠及麻葉海棠，冬季不必遮蔭。

(四) 肥料：施肥勿過多，以少量多次施放較為安全。

休眠期及移植後不久，或生長不良時避免施肥，以防枯死。海棠肥料以油粕汁為主，混入少許骨粉或過磷酸石灰，以保持葉色鮮艷。(玫瑰中心張君詳提供資料)

海棠的種類極多，多數原產於南美洲及熱帶、亞熱帶地方。葉形千變萬化，具有優美斑紋、斑點，也有生毛茸的。葉緣缺刻，鋸齒或平滑，捲葉的變化甚多。高雅奇觀，美不勝收。花由葉腋抽出，雌雄同株，花色有紅、白、粉紅等色，繁殖容易，可供室內裝飾或庭園佈置。

分類：通常可將海棠分為下列三類：

(一) 四季海棠——常年開花，葉片有紅、綠兩種，可供庭園布置。需要光線、水分較其他海棠為多，夏天特別注意通風，以防腐爛。

(二) 觀葉海棠——葉形變化甚多，可供室內裝飾之用。

(三) 球根海棠——開花多，花朵大，花色艷麗，低溫情況下發育良好，本省較難栽培。

繁殖：海棠繁殖方法如下：

(一) 播種——四季海棠及球根海棠可用種子播種。

(二) 扦插——觀葉海棠用扦插繁殖，葉插或莖插法都可以。

(三) 分株——大株可分小株，此法最

立農牌農藥信用可靠品質優良
敬請愛用！

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 水稻紋枯病
滅紋 液劑 | 水稻黑尾乳塵子、褐飛蟲
好寶蝨 乳劑 |
| 水稻螟蟲、蔬菜青蟲
益利農 乳劑 | 柑桔紅蜘蛛
必利果 (DN)乳劑 |
| 水稻螟蟲等
強力滅拉松 乳劑 | 大克蠟 (ケルセン)乳劑42 |
| 富穗多 乳劑 | 柑桔害蟲、西瓜螟蟲
強力樂果 乳劑(大減速)46 |
| | 樂果 乳劑(大減速)20 |

意大利蒙地卡地尼 (Montecatini)

ASPOR (阿斯巴)

柑桔、蔬菜、瓜類、馬鈴薯、蕃茄、大豆等各種病害之剋星！

新進口武田農藥

濃厚 武田マイコン®

蔬菜：軟腐病 瓜類：露菌病
柑桔：潰瘍病 蕃茄：馬鈴薯：疫病
菸草：野火病 洋葱：腐壞病

材ペスタン®

柑桔：粉介殼蟲 水稻：飛蟲・負泥蟲等
香蕉：粉介殼蟲

武田メル錠

水稻：稻熱病・胡麻葉枯病

所有農藥皆有登記証



武田藥品工業株式會社



立農化學工業股份有限公司
台北市南京西路22號·電話：541246·541108