

海棠栽培



為簡單安全。

(一) 扦插時期：以二至三月，九至十一月為宜。

培養土調製法：

(一) 腐葉土三分，堆肥三分，田土四分。

(二) 腐葉土四分，堆肥四分，牛糞二分。

(三) 腐葉土五分，田土四分，砂一分。

培養土中可加入少許石灰，中和酸性，使酸度 (pH) 為六·二至六·六。

栽培：注意溫濕度與光線的調節，適當施肥。

(一) 溫度十八度C至二十五度C為適溫。三十度C以上，十五度C以下，發育不良。三五度C以上，五度C以下，生長停止。

(二) 澆水與濕度：海棠根淺，根羣細小，所以水分不可缺少，但必須注意排水良好。夏天應注意通風，在高溫多濕情況下，最易腐爛。

夏季每天澆水一次，冬季兩三天一次，最好在早晨澆水，除雨天少給水分。

(三) 光線：一般不喜直射光線，必須遮蔭，強烈光線會使葉子的顏色變黃或燒焦。四季海棠、木立海棠及麻葉海棠，冬季不必遮蔭。

(四) 肥料：施肥勿過多，以少量多次施放較為安全。

休眠期及移植後不久，或生長不良時避免施肥，以防枯死。海棠肥料以油粕汁為主，混入少許骨粉或過磷酸石灰，以保持葉色鮮艷。(玫瑰中心張君詳提供資料)

海棠的種類極多，多數原產於南美洲及熱帶、亞熱帶地方。葉形千變萬化，具有優美斑紋、斑點，也有生毛茸的。葉緣缺刻，鋸齒或平滑，捲葉的變化甚多。高雅奇觀，美不勝收。花由葉腋抽出，雌雄同株，花色有紅、白、粉紅等色，繁殖容易，可供室內裝飾或庭園佈置。

分類：通常可將海棠分為下列三類：

(一) 四季海棠——常年開花，葉片有紅、綠兩種，可供庭園布置。需要光線、水分較其他海棠為多，夏天特別注意通風，以防腐爛。

(二) 觀葉海棠——葉形變化甚多，可供室內裝飾之用。

(三) 球根海棠——開花多，花朵大，花色艷麗，低溫情況下發育良好，本省較難栽培。

繁殖：海棠繁殖方法如下：

(一) 播種——四季海棠及球根海棠可用種子播種。

(二) 扦插——觀葉海棠用扦插繁殖，莖插或葉插法都可以。

(三) 分株——大株可分小株，此法最

立農牌農藥信用可靠品質優良
敬請愛用！

水稻紋枯病
滅紋 液劑

水稻黑尾乳塵子、褐飛蟲
好寶蝨 乳劑

水稻螟蟲、蔬菜青蟲
益利農 乳劑

柑桔紅蜘蛛
必利果 (DN) 乳劑

水稻螟蟲等
強力滅拉松 乳劑

大克蠟 (ケルセン) 乳劑 42

富穗多 乳劑

柑桔害蟲、西瓜螟蟲
強力樂果 乳劑 (大減速) 46

樂果 乳劑 (大減速) 20

意大利蒙地卡地尼 (Montecatini)

ASPOR (阿斯巴)

柑桔、蔬菜、瓜類、馬鈴薯、蕃茄、大豆等
各種病害之剋星！

新進口武田農藥

濃厚 武田マイコン®

蔬菜：軟腐病 瓜類：露菌病
柑桔：潰瘍病 蕃茄：馬鈴薯：疫病
菸草：野火病 洋葱：腐壞病

材ペスタン®

柑桔：粉介殼蟲 水稻：飛蟲・負泥蟲等
香蕉：粉介殼蟲

武田メル錠

水稻：稻熱病・胡麻葉枯病

武田藥品工業株式會社

所有農藥皆有登記証



立農化學工業股份有限公司
台北市南京西路22號・電話：541246・541108