

開根素 健穡素

爛根性 新稻熱病 防治法

第一期水稻自播種期，即常見黃萎等情形，一遇霜寒即凍死，未凍死者亦不易長大（其他植物亦然），一般農友均誤認爲稻熱病而噴灑水銀劑或西藥生石灰；不但不能治癒，反而致死。拔起來看其根部即變成黑而爛，這是土壤中缺乏錳素與硼素，致使發根不良與葉面呼吸困難所引起之萎縮病。

這種情形時，請用「開根素與健穡素」即可治癒

用法如下：大噴霧器一桶水十五公斤，開根素或健穡素八公克（瓦），尿素二兩，隔三日開根素與健穡素輪流向葉面噴灑一次，三次即可恢復，如同時摻水銀劑噴灑，效果更顯著（水銀劑之用量是普通防治稻熱病之半量爲宜，否則形成水銀置換現象，使錳素脫離，其病狀更加厲害）

其他各種農作物之萎縮病與霜害亦可用同法防治，平常五~十日葉面噴灑一次，對於增收貢獻更大，殊對結實植物增收效果最大。（45公克裝批價開根素15元，健穡素20元）

天力化學工業股份有限公司
台北縣中和鄉中山路267巷4號
電話：966016 郵政劃撥5179號

使用農藥時摻本品可防治各種農藥無法防治之不知名病症，並且可加速恢復病弱現象，平常向葉面或根部噴灑均有強烈之開根作用。

（偏僻地區請到郵局利用郵政劃撥儲金）
5179號匯款採購送貨郵費本公司負擔
安全迅速方便每次三包以上無任歡迎

強根關鍵先健藥

萬病之源在根弱

山梔子性喜溫暖

植後第二年開花

〔問〕：早田可否種植黃梔子花？何時種植爲宜？如何栽培？經過幾年才能收成？價格如何？（王文義）
〔答〕：黃梔子又名山梔子，黃花爲包種茶用香花料的一種。栽培土地以肥沃之砂質壤土爲佳，惟其性

〔答〕：立枯病是一種細菌性病，病原菌由土壤侵入植物的根部，而後於導管內繁殖爲害，植物由下而上逐漸凋萎，莖先呈現條斑而後枯乾。菸草如發生立枯病，施藥防治均無效，目前仍以實施三年以上之非病菌寄主植物之輪栽制，較爲經濟有效。（陳羣）

較強健，於新質土壤亦可栽培，但因性喜溫暖多濕，故乾燥時應行灌溉以免旱害。

繁殖通常用插木法，於二~三月間採取上年或前年生之枝條插植於苗圃，經一~二年後，於三、四月間行移植。行距約三公尺，株距約二~四公尺，每公頃種植株數約爲一、三、八、八株，應施堆肥每公頃二萬公斤做基肥，種植後第二年即開花。

根據農業試驗所調查第七年收穫量，每公頃約爲一萬二千公斤，目前台北精製茶工廠收購價格約爲每公頃五~七元，年消費量約爲七萬公斤。如欲繁殖種苗或了解一般栽培及產銷情形，可逕向台北縣蘆州鄉仁復村成功路八十四號李樹根先生洽詢。（羅永春）

柳橙病害防治

〔問〕：柳橙患有黃龍病、炭疽病、根腐病及潰瘍病如何防治？（高雄縣杉林鄉月眉村清水路二十七一二號趙懷祥）

〔答〕：（一）黃龍病的防治方法爲：①燒却病株，②採用無病接穗，③徹底防治蚜蟲，④採用抗病性砧木。

（二）炭疽病的防治法爲：①燒却病株，②六~九月間噴射波爾多液。（三）根腐病須掘起根部土壤，露出被害根以追究病源，並儘量加強排水設施。如主根受害時，可削去患部及鄰近皮部塗布石灰硫黃糊。

（四）潰瘍病的防治法爲：①加強防風林設施，②驅除潛葉蛾，③六~八月間噴射波爾多液。

印度東南部栽植多

蘇仙、保舍甲好品種

〔問〕：本島栽培水果用大棗，其經濟價值如何？將來性怎麼樣？產量多少？（雲林縣虎尾鎮北溪厝十六號鄭源傑）

〔答〕：大棗即印度棗，爲本省新興果樹，南部栽培最多，因它有適應力強、結果迅速、產量穩定豐富、病蟲害少等優點，故栽培仍將很好，目前市價每斤七、八元。現在栽培較優良的品種有蘇仙、保舍甲等，均由寶生號選得，前者產量多，後者果實大爲其特點。（黃弼臣）

月間約噴射四次的波爾多液，而以颱風前後之噴射最有效。（翁仁祿）