

卵管及卵巢等。子宮位於女性骨盆腔內，是一梨狀的空心器官，在不懷孕時重約五十至八十公克；其長度約為六至八公分，白內至外可分三層。子宮的主要功能為在懷孕時提供胎兒發育的場所。在子宮的兩旁有輸卵管一對，左右各一，其一端與子宮相連，另一端開口於腹腔內。長度約為四。五吋左右，主要功能為把由卵巢排出的卵子輸送到子宮腔裏邊去，同時也是精子與卵子相遇發生受精的地方。卵巢也有一對，左右各一，其一端由卵巢帶與子宮相連，其他再以兩層很薄的腹膜與輸卵管相連，是排卵的地方。在子宮的下方是子宮頸，為子宮與陰道相通的地方，也是胎兒出生時必經的通路。

### 什麼是月經

自青春期以後，女性生殖器官的構造與功能漸趨完善，卵巢開始每月一次的排卵。腦下垂體前葉能分泌促黃素，刺激子宮內膜，使它增殖變厚，並且增加分泌液，做為受精卵着床的準備。如果卵子未受精，則子宮內膜即行剝落，而引起月經來潮。由於各人體質不同，每次月經來潮日期約為三至七日，月經週期為二十五天至三十五天不等。

### 正常與異常的月經

所謂月經週期，指上次月經開始之日起至下次月經開始之日，中間所隔日數，平均約為二十八日。即使月經很順的人，普通也會相差幾天，但只要相差不出十天即認為正常的月經。有些人月經週期相

差十天以上或一個月來兩次，或者雖然沒有懷孕但數月沒有月經，這很明顯是月經異常。有些人月經量過多或過少，月經來時很痛苦，切不可忌醫，白已亂投藥石，必須去請教婦科醫師。

### 2. 男性生殖器官的構造

一對睪丸，被包在陰囊裏面，睪丸內有許多細精管，是產生精子的地方。這些精子由副睪丸收集，經由輸精管而貯存於精囊內。在性交過程中，精子自儲精囊經過前列腺入尿道時，與前列腺分泌的液體混合成爲精液，再由陰莖排出。每次射精約可釋放出三至五億個成熟精子；只要其中一個精子與女性卵巢所排出的卵子結合，即完成受精作用。

### 3. 懷孕的發生

正常而成熟的男性在性交時，射入母體的精子，在陰道內每小時以七分之一的速度，游向子宮腔而入輸卵管，精子在女性體內最多生存三天左右。如果這時女性體內適逢排卵，等待在輸卵管內的很多精子中任何一個都有可能與卵子結合；精子與卵結合的過程叫做受精，於是一個新的生命便開始形成了。受精卵再從輸卵管進入子宮腔，經過五至七天的時間，受精卵一再分裂而變成一個帶有無數小毛的球，待抵達子宮腔時，便留在子宮內膜上，並漸漸埋入肥厚的子宮內膜中。此種現象稱爲「着床」。受精卵着床後，經過二百八十天的發育即成長爲成熟的胎兒，與胎盤一起娩出母體。

### 一般避孕方法的介紹

避孕方法的種類很多，個人可依其意願及需要去選擇其中任何一種方法。通常理想的避孕方法必須具備如下的條件：

- ①可靠有效，②容易使用，③不影響婚姻生活，④安全無副作用，⑤經濟實惠，⑥停止使用後無礙生育能力的恢復。

### 1. 一般的避孕方法

避孕原理在使精子與卵子沒有互相接觸的機會，以阻止受精作用的發生，計有：

### (1) 阻隔精子進入陰道的方法

①保險套：保險套是以橡膠製成的細長袋狀物，性交時套在男性的陰莖上，以防止射精時將精液射入女性陰道內。保險套在使用前應先檢查有無破損，破者不用。套上陰莖前，應先將保險套內面翻過來，於尖端放入少許藥膏再翻回去。套上陰莖後，外面再塗上油脂藥膏，以增加滑潤及快感。爲防止精液由上端空隙處漏出，女性可以同時採用安全藥膏或安全素片。


保險套的使用通常以一次爲宜，沒有破損者，可用冷水洗淨，留待下次使用。廢棄不用的保險套應毀其原形，棄於不爲人所發現的地方。保險套的使用常因破損或精子外溢而導致失敗，由研究及統計結果顯示，一百對夫婦施行一年後有一三。四%婦女再度懷孕。(未完·下期續)

**FILITAL**  
INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.  
FILIALI OLLA ROSSI AND HAAS COMPANY PHILADELPHIA

**羅門哈斯農藥**

在意大利附屬機構飛利多化學工廠出品

**可利生\***  
(KARATHANE WD)



一公斤紙盒原裝進口

◎說明書函索即寄

- 現貨進口經銷商：**
- 一、福慶公司：臺北市漢口街一段五十七號二樓
  - 二、惠光貿易有限公司：臺南市東門路二二三一號
  - 三、裕台公司農化廠：彰化市平和里平和莊五十號
  - 四、英明貿易有限公司：基隆市郵政信箱八六號
  - 五、群英公司：台北市錦州街二二一號之二二樓

臺灣總代理：**青象貿易有限公司**  
臺北市漢口街壹段壹肆肆號壹壹壹室  
電話：三三六六一七七

司公斯哈門羅城費州賓國美\*  
標商記登