



農業信箱

茉莉花圃除草

可試用草滅淨

〔問〕：(一)茉莉花圃雜草甚多，可否使用除草劑？若可，須使用何種藥劑？使用方法如何？
 (二)栽培一年多，老枝是否需要剪除？
 (三)施肥方法及時間如何？用何種肥料？
 (四)蟲害（通常均在大的主幹上）如何消除？用何種農藥？
 (五)有時候整株乾枯是何原因？有何預防方法？

〔答〕：(一)可介紹有關茉莉花栽培的書籍（中、英、日、德文版皆可）？彰化縣田尾鄉福田村二十號陳嘉琛。
 (二)茉莉花使用除草劑，目前還沒有研究的報告，而對於溫帶許多花木使用十七種除草劑，自一九五五至一九六八年間由十數位學者實驗的結果，仍然認為「草滅淨」(Simazine)效果最好。
 (三)「草滅淨」在臺灣省農會農藥部有賣。日本原裝者有水溶劑及粉粒劑兩種，前者較好，可溶於水中噴酒，每分地可噴兩磅原液，於春、秋二季各噴一次，毒害最少，除草效力又強。

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔答〕：(一)栽培一年多，可將部分老枝剪除。
 (二)施肥可於株間施用，春、秋、冬均可，但以三要素為主。
 (三)殺蟲殺菌農藥，每月撒布一次，以天生錳配馬拉松或巴拉松均可。
 (四)整株乾枯是為地下根部死亡，這是患了紋羽病，在排水不良、肥料不足地區易於發生。預防方法除排除積水及施用堆肥外，並拔去病株予以燒毀及使用石灰。
 (五)本省茉莉花栽培書籍很少，國外也不多，多與香科植物並列出版而無單行本。（杜廣姓）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔答〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

白菜及甘藍

塑膠袋育苗

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

荸薺栽培法

〔問〕：(一)荸薺種苗何處有賣？如何育苗？一個荸薺能生長幾棵苗？一分地要多少種子？
 (二)本田如何栽培？種植後是否可斷水？（台北市士林區福林路二二三巷一一〇號詹清林）

〔答〕：(一)荸薺種苗可向北投區農友採購（向北投區農會詢問）。其育苗方法如下：
 育苗適期：四月中旬左右。

〔問〕：(一)早生結球白菜及甘藍，育苗之塑膠袋用何種為宜？長度若干？
 (二)使用時如何處理？
 (三)備用土壤如何處理？覆蓋洋菇後的土壤可否使用？
 (四)塑膠袋裝土用何種方法較為迅速？
 (五)塑膠袋裝土後，如何排畦及播種？
 (六)播種後如何管理？
 (七)發育成長期間有變黃現象，而根部發現有如葱根的細蟲，請問如何防治？
 (八)軟腐病如何防治？
 (九)甘藍雜交新品種，種子何處有售？（台中縣大甲鎮孟春里臨江路一〇八號洪忠雄）

●原料自日本進口！

最好綠 No2

BEST GREEN

興達化工廠出品

最好綠是：
促使農作物迅速茁長成熟
之最佳植物營養劑！

使用濃度
一〇〇〇倍
比其他的
藥劑省錢

通用農作物
花 名 水 瓜 果 類
菜 蔬 類 類 類

密度：行距一六十公分，株距一四十公分。

栽植深度：五至六公分。

一公頃所需的種塊：十公斤。

育成苗株：約一千四百—一千五百株。

(二)本田的栽植方法如下：
栽培適期：七月十五日至七月二十日。

整地：本田整平。

栽植密度：行距一百公分，株距八十公分。

栽植深度：八至九公分，每叢葉狀莖十至十二枝。

灌水：栽植後立即灌水，水深二至三公分。生育期水深經常保持三至四公分，勿斷水。

施肥量：(每公頃的施肥量)
硫酸銨 六十至七十公斤
過磷酸鈣 二十至二十五公斤
氯化鉀 四十至四十二公斤

追肥時期：
第一次：定植後十五天左右，施用五分之一量。

第二次：定植後三十至三十二天，施用五分之二量。

第三次：定植後四十五至五十天，施用五分之二量。(王進生)

**本省南部氣溫高
不適栽培馬鈴薯**

【問】：(一)馬鈴薯在本省南部，如高雄岡山、橋頭一帶，是否適宜栽培？

(二)種薯在南部或北部何處可以購得？每分地需要多少種薯？消毒藥劑以何種較好？

(三)施肥作業如何施行？(台北縣永和鎮安樂路九八號黃澤欽)

【答】：(一)馬鈴薯在本省南部是可以種植的，但利潤不高，因為馬鈴薯是要氣候較冷或白天夜間溫差大的地方才會長大。如果夜間土溫高，馬鈴薯就不易肥大，而產量也低，所以收益上並不合算。

(二)省農會每年向日本訂購種薯，分配期在十月上、中旬，可向鎮農會訂購。至於種薯消毒，可用水銀劑液浸漬，如使用省產種薯，則必須先選擇無病者(毒素病、瘡痂病等)，並且經過消毒後才可栽種。

(三)馬鈴薯施肥，以多施有機質較好，化學肥料施用量如左：

肥料名稱 基肥 追肥

堆肥 一千二百公斤 二百公斤

硫酸銨 六十八 二十七

過石 五十六 〇

氯化鉀 二十八 十二

(陳培昌)

色拉醬製法

【問】：色拉醬的製法怎樣？(台中縣和平鄉谷關台電達見工程處陳泉銘)

【答】：色拉醬即蛋黃醬(英名Mayonnaise, 日名マヨネーズ)，是以蛋黃、醋及植物油為基本材料，利用蛋黃的膠着力使油和醋的細粒膠着混合，最後變成乳酪狀或濃厚的汁，再加以食鹽及胡椒等調成的醬，對於生菜、冷魚等的調味，甚為合適。

材料：蛋黃一個，芥末一茶匙，砂糖一茶匙，食鹽少許，白醋一湯匙，胡椒少許，油一杯。

牌子老日產★農藥成份確實

五七年水稻二化螟虫試驗成績第一
殺虫範圍廣，可收綜合防治功用
殺虫力強、毒性輕微、速効性的
水稻、果樹、蔬菜綜合殺虫劑。

註冊商標

益農產乳劑

工ルサン50%

藥力強/殘効性期長/
最適合水稻、果樹害蟲之驅除

註冊商標

心愛用乳劑

P I N 45%

紋穗液劑
水稻紋枯病特效藥

大生精液劑
園藝蔬菜病害殺菌劑

大滅蟲乳劑
蔬菜害蟲專用殺虫劑

治滅蟲乳劑
果樹害蟲殺虫劑

窒素+生長素+微量要素
荷蒙綠混合營養肥料
回復元氣，促進成長
調節產期，提高品質，防止隔年結實
精製結晶葉面散佈劑，用量少、效果好


中日技術合作 台灣日產化工股份有限公司 電話：771348
台北市內湖區安康路140號 710516

ROHM AND HAAS
PHILADELPHIA
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19105 USA

羅門哈斯
農葯

大生*四十五

(DITHANE* M-45)



三磅紙袋原裝進口

■現貨供應■

民豐化工股份有限公司

台中縣大肚鄉中和村中山路10~6號
電話：烏日局一〇六號

台灣總代理：

青象貿易有限公司

台北市漢口街壹段144號711室
電話：三三六一七七

◎說明書函索即寄

*美國賓州費城羅門哈斯公司
登記商標

廠製造出售。
〔問〕：(一)矽酸鈣肥料的性質成分如何？
(二)新竹縣香山鄉五福企業股份有限
公司出品的五福牌微量元素，其成分
與矽酸鈣有何差異？(南投縣草屯
鎮富寮里中正路四三七號陳正衛)

〔答〕：(一)台灣鍊鐵公司的製鐵
副產物—鐵渣，可做矽酸鈣的原料，
但一般礦物粉碎做成的確用「矽酸鈣
」名稱，但可溶性矽酸含量甚少，因
此對作物沒有效果。
(二)「矽酸鈣肥料」若由鐵渣製成
者，就含有可溶性矽酸及鎂，否者無
效。省農會辦理進口的日本門鐵公司
產品「矽酸鈣」肥料，它的保證成分
如下：可溶性矽酸三十三%，鐵成分
四十五%，檸檬酸可溶性鎂四多。
(三)鐵、錳、鋅、銅、硼、鉬、氯
等七種元素，現在被認為是植物生長
所必需的無機養分，稱為微量元素。
市面上的微量元素肥料，一般都沒有
公定的保證成分，未知其成分如何。
矽酸鈣的主要成分為矽酸及鈣，但有
些日製產品含有少許微量元素。(邱
再發)

市面發售矽酸鈣
成分含量不一致

魚池鄉適栽大粒桶柑

〔問〕：(一)請問溫州蜜柑及早生
大粒桶柑苗何處有賣？魚池鄉是否適
合栽植？
(二)柑桔有一棵單獨主枝發生落葉
，請問是患了什麼病？(南投魚池鄉
東池村文武巷十四號王明金)

〔答〕：溫州蜜柑近年來專門繁
殖苗木者很少，請自行繁殖。大粒桶
柑苗木可函詢宜蘭縣頭城鎮新建里一
鄰六號楊金城先生。
魚池鄉在氣溫方面來說，比較適
於大粒桶柑的栽培；至於溫州蜜柑雖
然也適於該鄉生長，但氣溫過高，易
產種子。
(二)柑桔單獨主枝落葉原因，有主
根腐爛，主枝莖部受天牛咬害或黃龜
病等，請詳細觀察落果狀況才能查出
病因。(翁仁祿)

作法：蛋黃、鹽、香料與醋在飯
碗中調和均勻，然後加入生菜油，應
一滴一滴地加，隨攪隨加，同時攪拌
的方向也要一致，否則蛋黃不能將油
和醋膠合起來，而不能成爲稠厚狀。
以後漸漸增加油的分量，直待油全部
加完爲止，最後加入醋一茶匙(亦可
用檸檬汁代替)，和勻後使用。
蛋黃醬是基本調拌料，一杯蛋黃
醬和半杯切碎的胡瓜、番茄、洋葱各
一湯匙，並加鹽少許，是海鮮類食物
最佳的調拌料。(陳景福)

農友們!!
興農交配

日光極早生花椰菜 (四月開始播種40天收成)
最有利益品種
初夏第一號甘藍
將軍甘藍 夏天最耐病品種
輝甘藍 (颯風後復活力最強品種)
興農35天包心白菜 (春夏容易栽培品種)
陽光大甜椒 高冷地夏季栽培加倍豐收
陽光大甜椒

興農種子行
三重市重新路三段一〇八號
電話：九七二六三四號