

密度：行距一六十公分，株距一四十公分。

栽植深度：五至六公分。

一公頃所需的種塊：十公斤。

育成苗株：約一千四百—一千五百株。

(二)本田的栽植方法如下：
栽培適期：七月十五日至七月二十日。

整地：本田整平。

栽植密度：行距一百公分，株距八十公分。

栽植深度：八至九公分，每叢葉狀莖十至十二枝。

灌水：栽植後立即灌水，水深二至三公分。生育期水深經常保持三至四公分，勿斷水。

施肥量：(每公頃的施肥量)
硫酸銨 六十至七十公斤
過磷酸鈣 二十至二十五公斤
氯化鉀 四十至四十二公斤

追肥時期：
第一次：定植後十五天左右，施用五分之一量。

第二次：定植後三十至三十二天，施用五分之二量。

第三次：定植後四十五至五十天，施用五分之二量。(王進生)

本省南部氣溫高
不適栽培馬鈴薯

【問】：(一)馬鈴薯在本省南部，如高雄岡山、橋頭一帶，是否適宜栽培？

(二)種薯在南部或北部何處可以購得？每分地需要多少種薯？消毒藥劑以何種較好？

(三)施肥作業如何施行？(台北縣永和鎮安樂路九八號黃澤欽)

【答】：(一)馬鈴薯在本省南部是可以種植的，但利潤不高，因為馬鈴薯是要氣候較冷或白天夜間溫差大的地方才會長大。如果夜間土溫高，馬鈴薯就不易肥大，而產量也低，所以收益上並不合算。

(二)省農會每年向日本訂購種薯，分配期在十月上、中旬，可向鎮農會訂購。至於種薯消毒，可用水銀劑液浸漬，如使用省產種薯，則必須先選擇無病者(毒素病、瘡痂病等)，並且經過消毒後才可栽種。

(三)馬鈴薯施肥，以多施有機質較好，化學肥料施用量如左：

肥料名稱 基肥 追肥

堆肥 一千二百公斤 二百公斤

硫酸銨 六十八 二十七

過石 五十六 〇

氯化鉀 二十八 十二

(陳培昌)

色拉醬製法

【問】：色拉醬的製法怎樣？(台中縣和平鄉谷關台電達見工程處陳泉銘)

【答】：色拉醬即蛋黃醬(英名Mayonnaise, 日名マヨネーズ), 是以蛋黃、醋及植物油為基本材料, 利用蛋黃的膠着力使油和醋的細粒膠着混合, 最後變成乳酪狀或濃厚的汁, 再加以食鹽及胡椒等調成的醬, 對於生菜、冷魚等的調味, 甚為合適。

材料：蛋黃一個，芥末一茶匙，砂糖一茶匙，食鹽少許，白醋一湯匙，胡椒少許，油一杯。

牌子老日產★農藥成份確實

五七年水稻二化螟虫試驗成績第一
殺虫範圍廣，可收綜合防治功用
殺虫力強、毒性輕微、速効性的
水稻、果樹、蔬菜綜合殺虫劑。

註冊商標

益農產 乳劑

エ ル サ ン 50%

藥力強 / 殘効性期長 /
最適合水稻、果樹害蟲之驅除

註冊商標

心愛用 乳劑

P I N 45%

紋 穗 液 劑

水稻紋枯病特效藥

大 生 精 液 劑

園藝蔬菜病害殺菌劑

大 滅 蟲 乳 劑

蔬菜害蟲專用殺虫劑

治 滅 蟲 乳 劑

果樹害蟲殺虫劑

窒素+生長素+微量要素

荷 蒙 綠 混合營養肥料

回復元氣，促進成長
調節產期，提高品質，防止隔年結實
精製結晶葉面散佈劑，用量少、效果好

中日技術合作 台灣日產化工股份有限公司 電話：771348
台北市內湖區安康路140號 710516