

草

魚

養

殖

郭河

一分二釐的養魚池，適養草魚魚花二十萬尾，然後視其養成收容密度的予間捕出售。

草魚養成池也可混養白鰱、鰻魚（鯪魚）、少量的大頭鰱，不過如要混養，應將草魚的放養量酌予減低，不然放養過多，不但影響其成長，且收容密度過大，又不予間捕時，有泛池斃死的危險，得不償失。

現在本省魚花均為人工繁殖，養成後的價格相當便宜。所以若混養種類多，將來要捕獲選別出售時相當費力。如飼養量少，有人力可應付尚無問題，然要大量處理，不但費力、費時，且在此低價格的情形下，要花如此高代價的勞力似不值得，不如將各種魚苗分別飼養較為實際。

魚花盛期·適宜購放

草魚魚花每年約從三月下旬直到七、八月間均可人工繁殖，最能大量繁殖供應時期為四、六月，其價格每萬尾便宜時二、三百元。通常在三、四月間最先繁殖者，數量有限價格較貴，到四月後隨着繁殖量增加價格漸降，在盛期大量繁殖時每萬尾三百元左右，到七、八月後繁殖量漸減，價格又稍好一點。

總之草魚魚花的價格是隨繁殖量及需求量的變動而變動的，所以要購買較便宜者，應在五、六月間的盛期較適宜。

草魚花的飼料，初以煮熟的蛋黃與泡麵粉漿混合給予就可，隨着其成長，當可混用花生餅漿或豆餅漿。養

到一寸以後，雖可素食草類，但因幼魚索食較粗草類有困難，通常有購萍卵飼養，然萍卵有時會帶入病菌，而使魚種病遭無謂的損失。因此，所有飼料應先以漂白粉有效成分的十五萬分之一濃度消毒液浸洗消毒二十至三十分鐘。因魚苗食量有限，最好仍能給予較高營養的豆餅、花生餅等粉碎，使其成為健康的魚苗。

消毒魚池·防治病虫

防治養魚池虫害，應在整理魚苗養成池時，以漂白粉或消石灰，澈底的消毒，殺除一切有害的病菌。放養後的防治藥劑，現最適用者為地特松，此種農藥對於有脊樞動物毒性甚低，但對於無脊樞動物毒性甚高。

所以對於池中病虫害的防治，最理想且最安全的方法，應先殺除幼病虫，如施放其有效成分的三百萬分之一濃度，就能達到其效果。再較大的病虫，可增加至一百萬至一百五十萬分之一，即可防治。通常可能影響魚苗的範圍，為五十萬分之一濃度以下，所以只要將池水及其有效成分濃度算的準確，即可安全的使用。

最好在晴天太陽尚未出來時，將藥粉泡池稀釋，平均撥撒於池水面，使其分散即可。

(日本セオライト(嘉禾立得)是種土質改良劑，主要成分為矽酸，可吸收爛泥毒氣，促進池水氧化清淨，當可防止池水的惡變。(嘉義縣布袋鎮見龍里內田邱榮亮先生來函問草魚養殖問題，請參考。)

強力 / 特效 / 品質 / 保證 /

水稻：**三·三化螟、稻苞蟲特效藥劑**

獨 一50%乳劑 飛快殺50%乳劑 巴力多46.6%乳劑

水稻：**稻熱病及紋枯病特效藥劑**

稻熱藥5%乳劑 紋枯滅6.5%乳劑

水稻：**飛蝨、浮塵子速效性藥劑**

稻飛殺20%乳劑 稻飛殺50%水和劑

果蔬 殺菌劑：**蓋撲丹50%水和劑**

富果丹50%水和劑

農藥



裕台企業股份有限公司農業化工廠

廠址：彰化市中華西路一二六號 電話三〇四四號

總公司：台北市衡陽路六十四號