

### 訪張維石農友

## 談：養鹿

屏東縣潮州鎮光春路三五五號張維石農友，副業養鹿多年，我曾專程參觀訪問。

鹿有水鹿和梅花鹿，張農友所養的都是水鹿，大大小小共有十三隻。據張農友說：他養鹿已有三十年的經驗了。

鹿是草食性的動物，凡是青草、樹葉都可飼餵，不過最好是自己能種些牧草，如狼尾草、南非鵝草或青刈玉米等都最適宜。至於飲水；張農友說，要在每天早上和傍晚時各餵一次，且飲水內需摻些食鹽，以助生長。

養鹿，除在鹿茸萌發期加餵精料以外，平時只餵青草料即可，給予任食。但張農友自去年開始，全年加餵精料，據稱效果很好，今年長出來的鹿茸也都比往年粗大。

鹿舍的設計，一定要力求堅固，通風良好。鹿舍應每星期清理一次。換除舊墊草，鋪上清潔乾淨的墊草，維持衛生。


公鹿養到一歲大時約有六十台斤重，此時即可配種。母鹿一年可產一胎，每胎一隻。小鹿生下後，可全部由母鹿帶養，長到兩個月大時即可斷乳。一般是在此時出售，每隻的售價在兩萬元左右。

鹿茸於春天開始萌發，此時鹿的頭部會覺得癢癢的，因此常在欄柵上磨擦，為使鹿茸長得好，必須在此時加餵精料。精料可用麥、豆餅和玉米粉混合而成。鹿茸每年可收一次。滿一年的小鹿的鹿茸每對約有半台斤重以上。養到五歲以後，體重可達兩百台斤，鹿茸可長達一尺半以上。重約五至八台斤，以每合兩三百元至四百元計算，其收益是非常可觀的。


據張農友說：他認為養鹿的利益要比種水稻好，因為水稻成本太高，價格偏低，且易遭受風災水災侵害。而養鹿就不會這樣，因為鹿茸是每年都會長出來的。

一般割取鹿茸，必須在鹿茸已長成而尚未硬化時割下，如割得太早，鹿茸還沒有完全長成，非常可惜。如割得太遲了，角尖硬化，就不能當補品了。

割鹿茸時，會流大量的血，但是現在有止血藥，很方便。（屏東市民生路田中巷二號之一張學義）



張維石農友所飼養的水鹿（張學義）



### 無子四季蜜斯桃

彰化縣二水鄉惠民村山脚路八之一號張永樂農友，栽培成功楊桃新品種——「無子四季蜜斯桃」。

張農友說：無子四季蜜斯桃，是由軟枝種改良嫁接而成，果苗成長迅速，栽種一年即開花結果，初年產量每株約二十台斤，三年後每株產量可達三百台斤以上。

本品種的特點是除了無子四季循環開花結果，粒粒碩大（十兩以上，如上圖中左），味甜細嫩，食後無渣外，對氣候、土壤的適應性極大，抗病力又強，所以在栽培過程中不必做特殊病蟲害防治與施肥，經濟價值很高。（二水鄉大馬路九十八號陳文卿）

### \* 如何防治稻苗徒長病 \*

稻苗徒長病，俗稱「稻公」，客家話叫「揚旗」，是水稻栽培上的一大病害。這種病害在秧田期特別厲害，病株較健全苗為高，葉細長，呈淡黃色，被害嚴重的，常在插秧後至第一次除草前死亡。較輕的會延至孕穗期，逐漸形成鬚根，以後病株發育逐漸遲緩，致停止枯死。簡單的說：稻公在田裏，只會吸取肥料，而無所收穫。下面列出幾點防治的經驗，供農友們參考：

- (一) 注意晒種：稻種在晒谷場上，應在太陽末晒及谷場前將谷堆鋪開，避免谷場被太陽晒熱了才鋪下，以致燙悶了稻芽，形成被害。
- (二) 慎重選種：到各鄉鎮農會換領優良稻種，切忌以未飽穎稻谷作種。
- (三) 消毒稻種：用「谷樂生」水溶液或「利農元」稀釋液浸種消毒，不但可預防稻苗徒長病，且對稻熱病、胡麻葉枯病、稻菌核病亦可同時收效。
- (四) 防止秧田過分乾燥：秧田過分乾燥時，表土易於龜裂，致使稻田幼根切斷，影響幼苗生育，容易被害。
- (五) 拔除病株：不論在秧田或本田，被害苗和健全苗很容易分別，發現時，應立即拔除並燒毀，以免病株枯死後，病菌隨風吹散或附着於谷粒，而傳播病害。（雲林縣西螺鎮振興里十八號廖重樞）

# 農友經驗

