



西瓜栽培要點

〔問〕：(一)西瓜每分地能種幾棵？株距多少？

(二)三要素如何調配？

(三)用什麼藥可預防白粉病、銹病、瓜果蠅？

〔答〕：(一)台灣中部種植西瓜，畦寬一·八公尺，行距一·五公尺，株距〇·六公尺，每分地種一〇八〇株。

(二)每分地需氮素二十二公斤，磷素十三公斤，鉀素十五公斤。

(三)白粉病可用可利生一千倍稀釋液防治。

銹病—使用四—四式波爾多液防治。

瓜果蠅—用水溶性蛋白質加馬拉松各四百倍液防治。(高琦瑛)

中部適合種芒果

開花期間需乾燥

〔問〕：(一)本人想在旱田上栽種海頓及愛文兩種芒果，旱田地質是砂質壤土，排、灌水均為良好，位八卦山下，海拔不及百公尺，而四周都是竹園，請問是否適合栽植？

(二)以上兩種在中部着果成績如何？是否值得推廣？每株年產量多少？何處可買到有關栽植資料。(彰化縣

花壇鄉灣雅村彭員路一四號黃呈璋)

〔答〕：(一)栽培樣果需要的氣候條件，是開花前與開花時的天氣愈乾燥愈好，另一條件則需充足的陽光，台灣中部的氣候適合栽植。惟土質需疏鬆，土層要深厚，排水需良好，八卦山一帶土壤似無問題。

(二)已往在南投、台中等地，土質疏鬆陽光充足的地方，所種植的樣果，開花結實都很正常，但因開花結果期間不會管理，就會發生炭疽病與果蠅為害。

愛文樣果在台中、彰化一帶是值得推廣的，事實如何，請參觀后里、沙鹿等地所種植的成績便可明瞭。至於栽培管理資料請向農林廳推廣室索取。(張振甫)

低海拔山地

適栽橫山梨

〔問〕：(一)橫山梨是屬於何等品種。果實大小及口味如何？

(二)花蓮平地氣候是否適宜栽培？(三)如能栽培，其株距各若干？管理及施肥方法怎樣？

(四)成長後需幾年始可採收？(五)苗種何處有售？價格若干？(六)何時最適宜栽植？(花蓮吉安鄉南華慈雲六號張慧明)

〔答〕：(一)橫山梨為早期自大陸引進的品種，較適於低海拔地區栽培。果實特徵為近圓形、褐色、斑點大，重可達一公斤，肉質較日本梨差，渣滓多，味微酸澀，市場到處可見。

(二)若無三百公尺以上海拔山地，不宜栽培。

(三)株距六至八公尺，栽培管理法請向農林廳索閱推廣手冊。

(四)成長需視管理情形，至少五年生後才能結果。

(五)請向當地農會或新竹縣農會查詢可靠苗圃，每株約六—十元。

(六)國曆一至二月間。(李信芳)

梨樹可套袋防虫

盛花期不宜噴藥

〔問〕：(一)梨樹在春季開花抽出新芽時，心部會折斷這是什麼虫為害？怎樣防治？

(二)為害梨仔幼果的害虫有幾種？怎樣防治？

(三)梨樹開花期噴射殺虫劑是否會發生藥害？如何使用时可避免？

〔答〕：(一)可能為一種「姬食心虫」為害，應在成虫產卵前噴布殺虫劑預防。

(二)蛾類幼虫，除經常噴「殺虫劑」外，本辦法是實施「套袋」。

(三)不論何種藥劑在盛花期均不宜噴布，以免妨礙授粉。(李信芳)

鳳梨何以不抽穗？

〔問〕：鳳梨不抽穗是何原因？如何處理？(高雄大樹鄉龍目村七十八號之一洪和泰)

〔答〕：鳳梨株在自然狀態下未抽穗，其主要原因為鳳梨株發育軟弱或不够成熟，或植株本身的成分及營養狀態，不適於進行花芽分化，致有些植物抽穗，而有些植株則不抽穗。(黃季春)

原料自日本進口！

最好綠 NO2

BEST GREEN

使用濃度 一〇〇〇倍 比其他的 藥劑省錢

通用農作物 果樹類 瓜類 蔬菜類 花卉 茶葉 藥劑省錢

興達化工廠出品

最好綠是： 促使農作物迅速茁長成熟 之最佳植物營養劑！