

危險農藥與安全使用

張良傳

(續第七期)

農藥的毒性，常給人們帶來很多危險，因此使用時應講求及注意安全的使用方法，才不致使用者及消費者發生急性或慢性中毒，甚致喪失性命。因此，請農友們務必注意下列事項。

安全用藥

十五原則

(一) 不要購買不登記或不明成分的農藥：市面上常有一些貪圖厚利的農藥商，販賣未登記或成分不明的農藥，更有些不法商人，將較便宜的巴拉松或D D T等危險性農藥，冒充低毒性農藥，或將它加入低毒性農藥中，以減低成本，並以較低價格出售。農友們也貪圖便宜，隨便購用，以致使用時未能穿戴防毒衣具，及注意各種安全措施，因此很容易引起中毒。

在其施藥後的果菜，也未達到安全採收期就予採收出售，致常使消費者在不知不覺中，發生急性或慢性中毒，非常危險。

(二) 農藥及施藥器具應放置安全場所：凡農藥及有關施藥、量藥器具，均不可隨便放置，絕對不可放在大廳、廚房、床下等，以免被無知的兒童，因好奇而取出玩耍，發生中毒。更不可與食物太靠近，以免家人誤取他用，發生危險。正確的放置地方為倉庫或較高而陰涼處，並能以專櫃加鎖，不但可保安全，也較不易變質。

(三) 施藥前後注意檢修噴霧器具：

在施藥前，一定要先檢查噴霧器，如馬達有無故障，唧筒的吸水壓力有否正常，有無漏氣或漏水情形，噴頭及皮管接頭有無鬆解，以免噴藥工作中發生故障，再予修理，不但費時花工，也常因漏水漏氣，使藥液與皮膚接觸，引起中毒。在每次工作完畢後，也應將噴霧器具調整及沖洗清潔，以備下次使用，更可減少農藥腐蝕噴霧器。

(四) 調配農藥不可觸及原液：大部分農藥與皮膚接觸時，多會滲透進入人體內，尤其農藥原液，祇要少量接觸，就會很快的被滲入而中毒，或每次少量被吸入人體而引起慢性中毒。還有一些農藥，如好達勝、D D V P、富賜靈等，其揮發性較強，其蒸氣或粉劑微粒，漂浮空中，很容易由呼吸氣管吸入人體。

因此，在取藥調配時，必需先戴上手套及口罩。又在攪拌藥液時，一定要用竹棒或木棒，絕對不可用手代替。

(五) 田間施藥須穿戴防護衣具：多數農友常因怕麻煩，或自認對施藥很有經驗，或貪圖一時方便，尤其在天熱的時候，常不穿戴防毒衣具，更暴

蔬菜收成的保障

最新 蔬菜病害綜合防除藥劑 雷彈K

* 從育苗至收成全期防除病害 效果顯著可靠。

特點：

- ① 適用各種蔬菜，防治病害的範圍廣泛，保證藥效。
- ② 專治白菜的嵌紋病、軟腐病、或細菌感染的各種病徵。
- ③ 對易於發生的苗立枯病、紫紋羽病、露菌病尤有特效。
- ④ 高溫氣候連續噴霧，亦不生藥害。
- ⑤ 價格便宜，長期使用，十分經濟。
- ⑥ 500倍的水溶液，可適用任何病害

《原裝進口》

最新殺菌劑


雷彈K

金鳥

《說明書備索》



社：大日本除虫菊株式會社
台灣總代理：新 豐 行
台北市迪化街一段65號 電話：545627 · 516702



露身體，很容易引起中毒。因此千萬不可忽視農藥的毒性，一定要口罩、手套、眼鏡、帽子、塑膠衣及長統鞋等均穿戴齊全，才可工作，以免因圖一時的舒服而飲恨終生。

如因天氣炎熱，穿戴防護衣具不舒服時，寧願減少施藥時間，也不可以穿戴防護衣具。

(3)不可任意提高使用濃度：各種農藥其所防治的病蟲害的經濟、有效濃度，均經過有關試驗機關技術人員舉行田間試驗出來的結果，因此任意加多藥劑，不但是浪費，而且容易引起中毒。因作物施用過多或過濃的藥劑，很容易引起藥害，而且其毒性的消失，也一定須要較長時日。因此常有一些農藥，施用後雖已達到安全採收期，但作物體上仍殘留有尚未消失的毒性，影響消費者的健康。另一方面也容易引起害蟲病菌，產生抗藥性，防治就更加困難。

(4)不濫用農藥並照安全期採收：政府為維護國民健康，對農作物病蟲害防治的農藥種類，及施藥後的安全採收期，均有規定及限制，請農友們均能自己約束，自己多多參考每年「植物保護技術審議委員會」審議推廣的「植物保護推廣手冊」上的農藥，並參照其防治方法防治。

(5)施藥時不可飲食，身體不適時立即停止施藥：在施藥時，絕對不可吸煙、飲水或吃東西，以免藥液沾染或食入中毒。

又如施藥中突感身體不舒時，不可勉強施藥。如有頭痛、頭暈、腹痛及眼花等現象時，應立即停止工作，或去看醫生。

(6)施藥時須注意風向：施藥一定

不逆可風前進，而須順風前進，以免藥液或藥粉，施到體上。

(7)施藥中如有藥劑接觸應立刻洗淨：在施藥時如不慎接觸藥劑，應迅速用肥皂洗淨，若藥劑進入眼睛或口中時，要立即用稀薄食鹽水沖洗或漱口，以防中毒。

(8)身體正常的人才可施藥：身體不適的人較易引起中毒，如患感冒、貧血、肝臟不良、有外傷、前夜飲酒、睡眠不足、疲倦、未成年、孕婦、婦女月事期間、老人及身體虛弱或病初癒者，均不適擔任施藥工作。

又施藥工作，每天以不超過四小時為宜，並且不要多日連續不停地擔任施藥工作。

(9)施藥後需清洗身體及用具：施藥工作完畢後，必須用肥皂洗淨全身及漱口更衣，略為休息後才可飲食，但不宜喝酒。

防護衣具等應以肥皂水浸洗。
(10)施藥地應設立警戒標識：施過藥的農地作物，必須設立紅色紙等標識，以免人畜誤入，或採食蔬菜、果實，發生危險。


(11)剩餘藥劑適當處理：凡剩餘未用完的稀釋液，不可隨便倒棄，以免人畜踐踏，或污染水源，更不可留存噴霧器中帶回家，應掘穴深埋入土中，以策安全。

(12)農藥容器不可亂棄：凡農藥空瓶或包裝容器，不可隨便亂棄，以免無知孩童取去裝水玩耍，或有人檢拾他用，發生偶然中毒，應設法深埋土中。包裝紙、塑膠袋等，應設法燒燬，也可每村設置掘穴，並設立標示，集中堆放處理。

(全文完)

不銹鋼跑車問世!

- ◆首創不銹鋼跑車
- ◆70年代流線型設計
- ◆時速高達130公里
- ◆獨特五段變速
- ◆服務中心遍及全省各鄉鎮



《機車的霸王》



富士霸王 不銹鋼

跑車 100 c.c.