

露身體，很容易引起中毒。因此千萬不可忽視農藥的毒性，一定要口罩、手套、眼鏡、帽子、塑膠衣及長統鞋等均穿戴齊全，才可工作，以免因圖一時的舒服而飲恨終生。

如因天氣炎熱，穿戴防護衣具不舒服時，寧願減少施藥時間，也不可以不穿戴防護衣具。

(3) 不可任意提高使用濃度：各種農藥其所防治的病蟲害的經濟、有效濃度，均經過有關試驗機關技術人員舉行田間試驗出來的結果，因此任意加多藥劑，不但是浪費，而且容易引起中毒。因作物施用過多或過濃的藥劑，很易引起藥害，而且其毒性的消失，也一定須要較長時日。因此常有一些農藥，施用後雖已達到安全採收期，但作物體上仍殘留有尚未消失的毒性，影響消費者的健康。另一方面也易使害蟲病菌，產生抗藥性，防治就更加困難。

(4) 不濫用農藥並照安全期採收：政府為維護國民健康，對農作物病蟲害防治的農藥種類，及施藥後的安全採收期，均有規定及限制，請農友們均能自己約束，自己多多參考每年「植物保護技術審議委員會」審議推廣的「植物保護推廣手冊」上的農藥，並參照其防治方法防治。

(5) 施藥時不可飲食，身體不適時立即停止施藥：在施藥時，絕對不可吸煙、飲水或吃東西，以免藥液沾染或食入中毒。

又如施藥中突感身體不舒時，不可勉強施藥。如有頭痛、頭暈、腹痛及眼花等現象時，應立即停止工作，或去看醫生。

(6) 施藥時須注意風向：施藥一定

不逆可風前進，而須順風前進，以免藥液或藥粉，施到體上。

(7) 施藥中如有藥劑接觸應立刻洗淨：在施藥時如不慎接觸藥劑，應迅速用肥皂洗淨，若藥劑進入眼睛或口中時，要立即用稀薄食鹽水沖洗或漱口，以防中毒。

(8) 身體正常的人才可施藥：身體不適的人較易引起中毒，如患感冒、貧血、肝臟不良、有外傷、前夜飲酒、睡眠不足、疲倦、未成年、孕婦、婦女月事期間、老人及身體虛弱或病初癒者，均不適擔任施藥工作。

又施藥工作，每天以不超過四小時為宜，並且不要多日連續不停地擔任施藥工作。

(9) 施藥後需清洗身體及用具：施藥工作完畢後，必須用肥皂洗淨全身及漱口更衣，略為休息後才可飲食，但不宜喝酒。

防護衣具等應以肥皂水浸洗。


(10) 施藥地應設立警戒標識：施過藥的農地作物，必須設立紅色紙等標識，以免人畜誤入，或採食蔬菜、果實，發生危險。

(11) 剩餘藥劑適當處理：凡剩餘未用完的稀釋液，不可隨便倒棄，以免人畜踐踏，或污染水源，更不可留存噴霧器中帶回家，應掘穴深埋入土中，以策安全。

(全文完)

# 不銹鋼跑車問世!

- ◆ 首創不銹鋼跑車
- ◆ 70年代流線型設計
- ◆ 時速高達130公里
- ◆ 獨特五段變速
- ◆ 服務中心遍及全省各鄉鎮



《機車的霸王》



# 富士霸王 不銹鋼

跑車 100 c.c.