

破壞及出血、浮腫及發炎。
寄生蟲也可能迷入鼻腔、鼻淚管、中耳、喉頭、氣管、輸尿管、胆囊、胰臟或盲腸，以致發生阻塞、中耳炎、窒息、胆囊炎、肝膿瘍、盲腸炎等合併症。

十二脂腸虫症的主要症狀是慢性消化器障礙，嚴重的貧血及營養不良。皮膚及粘膜蒼白、下腹浮腫、四肢無力，甚至月經停止，性能力衰退。

鞭虫症多數無特別症狀。但有時發生輕度貧血、皮膚疹、消化不良及神經症狀。蟯虫的傳染力很強，是很普遍的腸內寄生蟲。因為蟯虫晚間爬出肛門外產卵，會引起肛門或外陰部奇癢、睡眠不足、神經衰弱等症。

診斷腸寄生蟲，最簡單可靠的的方法是採取大便，用顯微鏡檢查虫卵。每一種虫卵的形態完全不同，可以很快的辨別種類，也可以由虫卵的分佈量

，推算感染程度。

各種寄生蟲，有各種不同的特效驅虫藥，先要辨別寄生蟲種類，分別投用才可見效。因此要定期檢查大便，一經發現感染，就要立即請醫師處方治療。亂服成藥，不但無效，可能發生副作用中毒，最要不得！切忌，切忌！

等到患染腸寄生蟲才治療，實際上已經太遲了，因為寄生蟲在人體內，已產生某種程度的損害，極可能別人也給傳染了。所以預防重於治療，應該積極的採取下列治本辦法，消滅傳染來源，保護健康：

環境衛生：消滅腸寄生蟲的傳染源，使所衛生是最重要的。最理想是用抽水式馬桶，如果一時做不到，就要特別注意便所的環境衛生。

便器最好有蓋，窗戶要裝紗網，通風要好，避免蒼蠅、蟑螂（油虫）進出。便所內外要有自來水龍頭，便後馬上洗

手，不用公共毛巾。

餐廳的門窗要裝紗網。從外面回來或吃東西前要先洗淨雙手。食品及食器應有蓋，避免老鼠蟑螂污染。蔬菜要用清水洗淨後煮熟，不可生吃，因為用水肥種植的蔬菜，多半含有虫卵。菜刀和菜板也可能有虫卵污染，使用前要洗乾淨。

床鋪和被單上，也常發現虫卵散布，應該時常換洗被單等，洗乾淨後曬太陽，殺死虫卵。

個人衛生：不可赤足走路，田間工作要穿鞋，預防皮膚感染。養成吃東西前或上便所後，馬上洗手的良好衛生習慣。不可買不衛生的食品吃，培養兒童衛生習慣，常換衣服、洗澡、剪指甲、保持清潔。

定期檢查：感染虫卵後，不一定馬上有症狀，每年要定期的大便檢查，早期發現寄生蟲感染，可以早期治療。這樣一方面早日恢復本身的健康

，同時也可以避免再傳染給家人親友。

小節傷大雅

當你坐著的時候，是否腳會抖動，或是蹣跚二郎腿搖搖擺擺？自己也許沒有感覺，可是在別人眼中，就不好看了。與人談話要注意靜聽，對方講完才接口，切勿搶著先講，甚至用手拍人家肩膀，自己搶著講話，很失禮儀。在別人面前咳嗽、打噴嚏，都要用手帕掩起嘴巴來，談話中並要道歉。吐痰要吐在手帕裏，但在人家面前，或談話時，也要盡量避免。（賴）

用電小常識

(一)使用電器的時候，手必須是乾燥的。
(二)電器的插頭，也要保持乾燥。
(三)清潔任何電器時，須先把插頭拔下。
(四)不可把電線掛在鐵釘、金屬床柱，或自來水管上。
(五)室內裝設永久電線，要請電氣技工裝置。
(六)保險絲燒斷了，不可換上銅線，也不可任意加粗。（明）


吸煙壞習慣

美國參議院三月初通過了一項議案，決定自一九七一年一月一日起，禁止在廣播與電視上做香煙的廣告。我國政府也於三月底通過，嚴禁五專和

中小學學生吸煙。

香煙在社會上非常普遍，青年學生在耳濡目染之下，很容易學會了抽煙。學生抽煙的動機，多半出於好奇，或模仿大人，久而久之，便成了習慣，難以戒絕了。這種既影響健康，又浪費金錢的壞習慣，前途無限的青年，何必去學它呢？（俊笙）

ROHM AND HAAS
PHILADELPHIA
KELTHANE* MF
羅門哈斯農藥



柑桔外銷聲中的得力助手！

強力開路生乳劑

防治紅蜘蛛

現貨供應處：
正豐化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路一〇三號
電話：霧峰六三號·一六三號

台灣總代理：
青象貿易有限公司
台北市漢口街一段一四四號七一一室
電話：三三六一七七
◎說明書函索即寄
*美國賓州費城羅門哈斯公司登記商標