



生薑施肥

病害防治

〔問〕：(一)生薑如何施肥？
(二)種植後會變黃是何原因？
(三)如何會發生紋枯病？

〔答〕：(一)生薑的施肥量如下(一分地為基準)：
(二)花生豆餅——二百公斤(無花生豆餅時，可用堆肥二千五百公斤來代替)。

②尿素——七十五公斤。
③過磷酸鈣——一百公斤。
④氯化鉀——五十公斤。

施肥方法：

項目	基肥(公斤)	第一次追肥(公斤)	第二次追肥(公斤)
肥料種類			
花生豆餅	200	—	—
堆肥	2,500	—	—
尿素	25	25	25
過磷酸鈣	100	—	—
氯化鉀	16	17	17

在定植前將肥料混合施於溝底，與泥土混合後覆土二寸再定植。
定植後三十一四十天內第一次追肥，六十—七十天內第二次追肥。

〔答〕：(一)定植後變黃原因很多，如缺氮肥、肥料傷害、種薑腐爛、排水不良等，到底由那種原因影響，要經過實地觀察後才能明瞭。

〔問〕：紋枯病發生的原因，是由於莖葉繁茂、行株間通氣不良、濕氣太重或久雨引起病原菌加速蔓延所致。紋枯病可用新阿蘇仁可濕性粉劑，稀釋二千倍後噴布，或用大生溶水四百倍液防治。(會潤錦)

雞糞養蠅

〔問〕：(一)本人想飼養蠅子，未知一甲地需放多少蠅苗？
(二)飼養蠅子需用何種飼料？(嘉義縣朴子鎮梅華里六十六號陳文龍)

〔答〕：(一)蠅子的放養量，應視其體型大小而定，一般在——二台分目大小者，每坪可放養一合斤，一甲地等於二、九三四坪，可按此推算。
(二)一般施肥皆使用雞糞、花生餅等有機肥料，施肥量的多少，應視水質的肥瘠而定，無一定標準。施肥後能增進水中浮游生物的繁殖，而蠅子所攝食的是浮游生物，故無需另放飼料。(顏枝麟)

緬芋分葱間作

洋蔥施肥灌水

〔問〕：(一)芋頭及分葱施肥時期及施肥量如何？
(二)灌溉上應注意什麼？

〔答〕：(一)發生病蟲害時如何防治？
(二)收穫後如何儲存以備下期種植？
(三)嘉義縣義竹鄉頭竹村九十九號黃駿超)

〔答〕：(一)緬芋生育期長，所以應施用遲效性肥料，以堆肥及豬糞尿等為主，化學肥料只施用過磷酸鈣、氯化鉀、硫酸銨或尿素。肥效短雖能一時促進生育，但芋形不正，且易傷及根部和品質。

在里芋與分葱間作的情形下，分葱可施用硫酸銨或尿素。在分葱的生育初期，不妨使用少量的氮素，例如每十公畝一次尿素施用十一十五公斤，繼續施用兩次。分葱收穫後，應用堆肥及豬糞尿作為追肥，以免影響里芋的生育及品質。

〔問〕：里芋及分葱均不可缺水，每次灌溉量，相當於雨量二十——二十五公厘，即每坪的灌水量六十六公斤至八十五公斤，採用畦溝灌溉為宜。

〔答〕：分葱會發生腐爛、銹病、黑斑病等，在生育期定期噴射五百倍馬拉松及四百倍大生混合液，則可防治。
里芋有蚜蟲、腐爛病、污斑病、乾腐病等，故應避免連作，並噴射大生四百倍液，蚜虫宜噴射馬拉松五百倍液。分葱里芋施藥時，須加用展着劑。

〔問〕：收穫應選晴天時採收，里芋的貯藏，需選無傷口的芋頭為貯存對象，此外並無特別貯存法。分葱則捆成一小束(——二公斤)，放於通風乾燥的架上貯存。

三月下旬間作分葱(大頭葱)，在例年為期過遲，生育差(溫度太高)，惟今年迄今(四月下旬)溫度尚低，其生育諒必良好。關於芋頭及分葱品種的選擇，應根據氣候及土壤而定，不過芋頭以緬芋(緬芋)、檳榔心及烏播三種為優，分葱則以珠葱及蒜薹蔥兩種較好。

●原料自日本進口！

最好綠 NO2

台灣省政府農林廳登記農肥字第0111號

BEST GREEN

通用農作物：花香水蔬瓜果樹類、芥苳菜類

比其他的藥劑省錢

使用濃度：1000倍

興達化工廠出品

最好綠是：
促使農作物迅速茁長成熟
之最佳植物營養劑！