



### 梨樹休眠期可移植

#### 強行水平影響壽命

〔問〕：(一)三年生橫山梨，因場地關係需易地栽植，掘起時是否要帶土？

(二)傳說冬至前後栽植的果樹，結果率較高，春節後栽植者，結果率則差，請問是否屬實？

(三)三年生梨在年底遷移栽植，即行誘引水平使之結果是否可以？

(四)從主枝發生的新梢，是稱亞主枝或徒長枝？

(五)亞主枝幾年生應養成？位置是否不在主枝之上？

(六)徒長枝生於何處？可否誘引使它結果？

(七)一年生梨施肥量如何調配？

(八)何謂液肥？一年中除施三、四次三要素及堆肥外，液肥可否多施？

(九)肥量太多，是否會使果樹過於旺盛而不結果？(苗栗縣三義鄉鯉魚村聖王崎下廿號張俊雄)

〔答〕：(一)梨為落葉果樹，宜在落葉休眠期移植而無帶土，枝根略加修剪，並注意充分灌溉一次。

生長期移植較危險，尤以三年生大樹，必要時應選擇雨天，盡量帶土，勿使鬆散，並需將新梢嫩葉剪除，移後炎日仍需注意遮蔭灌溉，直至長

出新芽為止。

(二)傳說屬實，因冬至至果樹已進入休眠，春節之後則漸萌芽生長，栽植失時。

(三)木本果樹，移植當年，元氣大傷，所以不宜強行水平誘引。梨正常結果樹齡仍以五年後為適，過早結果會影響日後生長、結果及壽命。

(四)由主枝發出的新梢，統稱為側枝或發育枝，但可用修剪方法逐漸培養成亞主枝；徒長枝是指受特別刺激(如修剪不當)而生長不正常的枝條。

(五)亞主枝是指生長年齡及大小僅次於主枝的枝條，普通依修剪目的及方法將主枝剪短，使分生為兩個亞主枝。

(六)徒長枝多生於主幹或主枝及亞主枝的基部，此為枝條過分受水平誘引或彎壓而引起的。

它的外形直立粗大但不充實，容易擾亂樹型且不易結果，所以依其生長情形可從基部全部剪除，也可盡量誘引或酌量剪短，使它逐漸變為結果枝或更新枝。

(七)依土質及肥料種類而無絕對標準，大致三要素配合量一年生者，約各用五十公克。

(八)凡肥料混和於水均可稱為「液肥」，亦可單指人畜糞尿類的「水肥」。施用化學液肥應注意配合濃度，施用有機液肥則應完全腐熟，原則上均可少量多施。

(九)肥料過量，則果樹徒長不結果，據說：「胖夫妻不易生小孩」也是事實，特別是化學肥料使用過量，容

易使果樹死亡。(李信芳)

### 配合市場銷路

#### 藥材大有前途

〔問〕：(一)藥用作物的市場前途如何？適宜台灣北部平地沙質壤土栽植的藥用作物有那幾種？並請略述其經濟性。種苗何處可以購買？苗價多少？

(二)黃梔子現有那些品種？其經濟性和前途如何？並請略述栽培管理要點。何處有苗木出售？價格如何？

(三)杭菊、白菊經濟性如何？何處可以買到可靠種苗？(桃園縣觀音鄉公所建設課李清興)

〔答〕：(一)藥用作物如能大量生產，且配合外銷與市場的銷路，其前途極為樂觀。


適宜本省北部平地砂土栽植的藥物，有薏苡、山藥(懷山)、商陸、千金藤、莖求、地黃、印度蛇木、枸杞、麥冬、薑黃等，以上各種中藥均有外銷，種苗可向台北市公館農業試驗所特用作物研究室洽詢。

(二)黃梔子品種分大葉與小葉兩種。其花含香油約五十六%，如能大量栽培，外銷前途極有希望。

黃梔子為無性繁殖，優點為保持原有特性。一年生至二年生的支幹，以剪刀剪取約八寸至一尺長的插支，用扦插法插於苗床，然後澆水、中耕除草和施肥，並注意病蟲害，待第二年移植於本圃。行株距為一·五公尺×一公尺，需要苗木可向省農業試驗所特作室洽詢。

(三)杭菊、白菊經濟性如何？何處可以買到可靠種苗？(桃園縣觀音鄉公所建設課李清興)

## 農日 稻熱病特效藥 巧工 水和劑



(今年改用此型包裝)

台灣省農林廳農藥登記證 00 號

恒興源企業股份有限公司  
台北市建國北路六十七巷一號  
電話：546106·553906