

火雞嗝囊下垂症的防治

簡明龍

在火雞羣中，常會發現一些嗝囊鼓得大大的且往下垂的火雞，這雖不會造成太大的損失，但病雞混雜在健康的火雞羣中，看起來很不順眼的。且這種病有遺傳性，若不注意，將會傳給下一代。嗝囊脹大的火雞，很少有復原的可能，有時雖經外科手術，但以後仍會再脹大。

本病是由遺傳而來，帶有此病的火雞，嗝囊特別衰弱，熱天若飲過量的水時，嗝囊就會脹大下垂。有人實驗指出，火雞因吃了含有某種澱粉質的飼料，因產生過量的氣體，使嗝囊脹大。

病雞特徵

病雞主要的特徵，是嗝囊下垂脹大，很容易看到，如把嗝囊破開，可看到嗝囊壁變厚且稍有縐紋，有時會發現潰瘍。

病火雞食慾正常，但有很多的食物及水會留滯在囊中，使消化受到阻碍，嗝囊會繼續增大到約體重的四分之一，使行動不便。病火雞會繼續生長，但因消化受阻，火雞變得消瘦，發育不良。

本病為慢性疾病，病火雞很少能復原，死亡率約五〇%。致死的原因有三：

(1) 因嗝囊脹大，火雞行走時，以腳趾刺破嗝囊而死亡。

(2) 肺炎：當火雞低頭時，囊中食物水分倒流入氣管中，形成異物性肺炎而致死。

(3) 餓死：病火雞雖然能吃，但吃進去的飼料，大部分留在嗝囊中，使火雞消化不得而死亡。

預防方法

預防方法有四點：

(1) 注意選種，把帶有嗝囊脹大下垂的種火雞淘汰。

(2) 避免火雞暴露於炎熱的陽光下，放牧的火雞要特別小心。

(3) 儘量供給清涼的飲水、水槽需有遮陰，以免陽光直接晒到飲水上。

(4) 熱天火雞需在有陰影處飼養，放牧的火雞，牧場上應種植能供給遮陰的高莖牧草。

治療方法

本病唯一的治療法是動外科手術，把嗝囊切開，排出貯集物，洗淨後再縫合。操作法如下：

把火雞固定，在鼓起的嗝囊上找一塊適中的地方，把羽毛除盡，然後洗淨，再擦上紅藥水。等紅藥水稍乾後，用外科手術刀小心切開約一寸長



農友牌

臺灣肥料股份有限公司出品

業務接洽處：台北市和平東路三段九十八號

電話：二一七一、二一七二、二一七三、二一七四、二一七五、二一七六、二一七七、二一七八

電報掛號：五二四一台北

肥効顯著
施用方便

尿素 香蕉肥料

硫酸銹 甘蔗肥料

過磷酸鈣 柑桔肥料

硝酸銹鈣 瓜果肥料

磷酸銹 花卉肥料

蔬菜肥料

歡迎採用
成份保證

電石氫氣

電極乙炔黑

液氨水塊石灰

液氨水塊石灰

液氨水塊石灰

液氨水塊石灰

液氨水塊石灰

液氨水塊石灰

液氨水塊石灰

液氨水塊石灰

主要產品

次要產品