

，切時刀要把直，一刀切下。切下的部位有三層，先是表皮，再皮下，以後是嚙囊木身的皮，切到皮下時即可看到嚙囊壁，此時需注意，用止血鉗把表皮及皮下組織一起夾住，以後再一晝切開嚙囊壁，此時會有大量貯存物湧出，等水分流完後，再用手指頭（中指及食指），探入嚙囊內，取出貯存在囊中沒有消化的青飼料，取淨雜物後，再倒清水到囊內，反覆沖洗三至四次以後，再縫合。在縫合之先需把傷口洗淨，最好在傷口上滴上一此抗身素藥劑後再縫。縫時用腸線縫

養鴨問題

唐清芬

，第一層先縫嚙囊，後再縫皮下組織，最後縫表皮，縫好後在傷口及周圍塗紅藥水即可。另外肌肉注射一、二西西的抗生素。

手術完畢當天，火雞不能飲水及吃料，第二天開始給水，第三天開始供給少許的飼料。若嚙囊脹得很大，可以把嚙囊剪去一部分後再縫合。

根據經驗，手術後約有五分之二會好，五分之二還是照脹不誤。若再脹大，可以再施行切開手術，但效果並不一定會痊癒，因此患有本病的火雞，最好淘汰。

唐清芬

鴨場環境：鴨場儘量選擇在距離市場或交通線近者，可節省運費及勞力，對於產品的運銷或購進飼料及養鴨用具等，均可獲得經營上的有利地位。

清潔兩岸：一方面有良好的水源，一方面有潔淨的沙灘與遮蔭，是最佳的養鴨場所，因此養鴨亦應注意水源的設備。

鴨舍位置：鴨舍建於自宅附近，雖便於管理及照料，但最好仍是建於濱水處，對鴨羣的活動覓食較有利。如自家附近沒有適當的池塘，可用自己的田挖成水池，解決水源問題。

鴨舍建造：鴨舍屋頂的高度，全省平均為二·八九公尺，屋頂的高度，通常隨各地的平均風力而決定。

多風之地，屋頂的高度皆較低，可以減低災害損失，少風之地，鴨舍屋頂的平均高度較高，可使照光換氣便利，有益鴨羣的健康。

疾病防治：為使鴨隻減少疾病，鴨場地應排水良好，鴨舍地面以水泥面較容易保持清潔與乾燥，如能以竹片及木材釘成有斜坡傾向的竹床，更能使鴨舍保持衛生，使鴨隻有乾燥的處所休息。

鴨舍平均面積：一·二平方公尺，平均每百隻所占鴨舍面積為十四·三方公尺，鴨場中運動場平均面積為七·一·二平方公尺。鴨舍可無四壁，但遇大風雨時須有遮欄設備才可。

鴨舍鋪墊物：稻草、細砂、褥草、枯野草及粗糠等均可當鋪墊物，但仍以稻草為主要，因稻草為自家農場上的副產物，不須現金購買，又稻草於使用後連同附着的鴨糞，為良好的堆肥。

總之，養鴨人家，如能辦理低利貸款，充實鴨寮設備，並且注意加強環境設施及疾病防治，養鴨業仍有利潤可圖。

北市農藥字0376號

日本原裝進口 水田除草特效藥



益米田粒劑

特點

益米田粒劑對於水田之主要雜草，如稗仔、貓毛草、學菜等以及水田所發生之一年生雜草，有綜合殺草防除之效用，為目前日本流行之最理想，最新製成品除草劑，具有兩大特點：

- (1)省工：本劑除草持効性長久，施藥一次即可保持至收成期，無須另行人工除草亦免拔稗。
- (2)安全：使用本劑安全性高，不影響水稻之成長。

使用方法：

作物名	適用雜草名	散佈時期	土壤種類	使用量	散佈方法
水稻	貓毛草、稗仔、學菜及其他一年生雜草。	插秧後	腐植土、土	每公頃20公斤	積水深度約1寸，待露水乾後散佈之
		第二期3~5天	壤土、粘土	每分地2.0公斤	均勻散佈



兼商化學工業株式會社 榮譽出品
台灣總代理：文山企業行
台北市南京西路416號 TEL: 542203

省工又省錢

免人工除草