



苦柚可做檸檬砧木

〔問〕：(一)中南部檸檬可以用酸柚做嫁接砧木，北部是否可以？

〔答〕：(一)六、七月收穫的檸檬何時開花？(二)苗栗縣大湖鄉栗林村水易？

〔答〕：(一)苦柚為檸檬的良好砧木，北部也適用。

(二)檸檬開花須視發育情形而定，凡發育正常的檸檬，一年四季都可以開花，但前期的產量可影響後期的開花。

六、七月收穫的檸檬，如發育正常，秋後仍可開花，如發育不正常，則須待明年春季開花。(張振宙)

鐵樹播種繁殖 不如分株快速

〔問〕：(一)本人播種鐵樹種子已有月餘，但為什麼還不發芽？

(二)鐵樹種子可否播種？

〔答〕：(一)何時播種？如何管理？(桃園縣觀音鄉大潭村第一鄰七號彭光被)

〔答〕：(一)鐵樹就是蘇鐵樹，其繁殖方法多用分芽。在樹幹或樹根旁邊發出的芽，長到十多公分時，即用利刀割下，再分栽就能生根，方法極為簡單。

(二)用播種繁殖當然也可以，但不及分株方法快速。應該注意鐵樹是雌雄異株。雌株所結的果實，很像扁桃

，外皮紅色，內有核；對花像鳳梨，色淡黃，長大時有一粒粒鱗片。

(二)你所播的種子沒有發芽，可能是採錯了雄株的老花蕊，請詳細檢查母樹。如確是果實，則播種後一月未發芽，並非不萌發，因為硬殼的核果播種後，有到二年後才發芽的。

鐵樹是很好的觀賞樹木，也可以盆栽。繁殖方法可分株，現在各庭園需要很多，你可再仔細研究，促使繁殖成功。(呂福和)

芒果旺盛要修剪 陽光不足色澤差

〔問〕：(一)本人栽於旱田的芒果，約十五年生，樹距二丈(太近點)，現在枝葉茂盛(可能地質肥沃)，致所生芒果，皮呈黑色，色澤不清，不鮮紅，致影響出售價格甚巨。不知可否利用整枝或施肥(氯化鉀)，使枝葉不太茂盛？

(二)陽光照射不足，為促其色澤鮮紅，應如何處理(施肥量和方法)？或有其他更佳方法(如噴藥或其他)？(台南縣大內鄉內村村七號楊銘輝)

〔答〕：(一)土地肥沃，所種芒果發育旺盛，應是好現象。枝葉如有過密情形，可就樹冠內部，不能接受陽光或生長衰弱的枝條，予以剪除。果皮呈黑色，似與枝葉過密無關，可能是染病所致，應噴布大生M二二或波爾多液等防治。

陽光不足，可影響果實色澤，宜

作支架使果實排列樹冠邊緣，充分接受陽光，無需用噴藥或施肥等防治。(張振宙)

桑寄生治婦人病 大量栽培可外銷

〔問〕：(一)據聞桑寄生(用寄生子寄生在野桑樹)專理婦人科及風濕症是否屬實？如果栽培該草藥，銷售前途如何？(因栽植桑寄生需要四、五年時間)

(二)本人想栽培貝母、柴胡、川芎、大黃、桔梗等，請問在海拔幾公尺處可以栽培？其種子、種苗本省何處有賣？

(三)本地有野生半夏，深山裏有黨參，本人擬將上述兩種藥草移植栽培，請問藥性是否可靠？如想引進外來品種，種子種苗在何處有售？(南投縣埔里鎮北門里中山路二九八號張清吉)

〔答〕：(一)有關桑寄生的效用，是專治婦人病，經查藥典結果，並未發現能治療風濕症。據聞此類藥材供不應求，如能大量栽培，當可爭取外銷。

(二)貝母、柴胡、川芎、大黃等，宜栽於海拔五百至二千五百公尺左右的高度，但桔梗在平地及上述高度均可栽培。其種子或種苗，可向台北市南京西路一六七巷二十一號東方農場洽購。

(三)有關半夏、黨參藥草，必須請專家鑑定，如能確定有栽培價值者方可種植，否則招致無謂的損失，其種子或種苗可向東方農場洽購。(徐原田)

BEST GREEN

★★★台灣省政府農林廳登記農肥字第0111號★★★

不二價

原裝進口 500cc 100元

1000cc 100元

250cc 35元

●原料自日本進口

最好綠 NO.2

●最佳植物營養劑

●使用濃度比其他的藥劑省錢

●促進農作物迅速茁長成熟之最佳通用藥劑

●適用於：蔬菜、果樹、稻、菜、洋蔥、香蕉、瓜、花、卉、類

●二〇〇〇倍

興達化工廠出品

貨物供應量

決定市場價格

〔問〕：(一)我想在高冷地種植櫻桃蘿蔔，如美麗、白皮、彗星、紫皮、寶玉等，不知何處有賣種子？

(二)以上各種櫻桃蘿蔔品種，目前台北市市場價格最低及最高大約多少？

(三)現在台北市最常見的有那幾種？以月分來說那幾個月出產較多？

(四)現在種植未來銷路如何？(台中東勢鎮上城里東關街九號魏永昇)

〔答〕：(一)櫻桃蘿蔔各品種種子，可向台灣農產企業公司訂購(台北市迪化街一段八十六號)。

(二)至於市價則視供應量的多寡而定，為順利供應，且不發生供過於求而致價格慘跌起見，應每隔一星期播種一次。小面積栽培每把(約一百公克)一·二—一·五元左右，即每公斤十二—十五元(零售價)，至於批發價則不詳，最好與台北市超級市場訂契約，且須作清潔栽培。

(三)現有栽培的品種，有美麗、彗星、寶玉等，以九月至翌年三月出產較多(目前大面積經濟栽培尚無)。

(四)大面積栽培常會發生滯銷，以小規模為妥。(王進生)

柑桔赤衣病防治要點

〔問〕：請問柑桔赤衣病何時會發生？如何防治？(台北縣貢寮鄉吉林村三十號李哲民)

〔答〕：柑桔赤衣病在雨季時發生較烈，熱帶地方則有長時期溫暖與潮濕氣候，所以更容易發病。防治方法如下：

(一)樹枝應適當剪定，以利通風。

(二)患部在細枝時，要強行剪定，然後噴布〇·四〇〇石灰硫黃合劑。

(三)患部在樹幹時，以利刀切除，再以〇·五%的谷仁樂生液塗刷，或使用糊狀石灰波爾多液塗刷，待乾後再以柏油塗刷，用以代替失去的樹皮。(翁仁祿)

溴化甲烷燻菇舍 浪費藥劑又危險

〔問〕：(一)燻蒸劑溴化甲烷何處有售？

(二)洋菇栽培材料上床後，可否使用該藥燻蒸？如何使用？

(三)使用除草劑後多久播種？播種覆土後是否可以使用(包心白菜田)？

(四)使用除草劑後，噴霧器用何種藥品洗淨以免藥害？(台中縣大雅鄉員林村神林路五號吳)

〔答〕：(一)溴化甲烷目前似尚無廠商向政府登記，不易買到，如需少量試驗，可洽台北市中山北路二段九十六號第一〇〇七室陶氏化學國際有限公司，商寄樣品。

(二)應用溴化甲烷燻蒸洋菇堆肥，省內缺少試驗結果可據。在密閉塑膠菇舍內，於堆肥上床後，用此藥燻蒸有二個缺點：浪費藥劑且危險，如有興趣試驗，最好在室外用塑膠布密蓋於堆肥上面，放入適當藥劑後，四周用砂土壓緊，不使漏氣。一般用藥量每一千立方呎用一磅，燻蒸約二十四小時。溴化甲烷能使人畜悶塞，應避免吸入，觸及眼睛或皮膚。

(三)除草劑種類及性質各異，施用方法各不相同，請參考推廣方法手冊。噴霧器使用除草劑後，可用亞摩尼亞水或肥皂水洗滌。(洪維懷)

發財農藥

殺鼠靈毒餌餅

最有效！

最經濟！

死鼠無毒
人畜無害
安全可靠



農復會、農林廳、糧食局共同推薦
台糖公司、台灣省農會
台灣省野鼠防治委員會長期採用
台北市政府衛生局家鼠防治專用
本公司加工供應

獨家供應：

嘉泰企業股份有限公司

公司：台北市仁愛路三段26號二樓 電話：776815
工廠：台北縣中和鄉連城路27號之二 電話：96-5466



香蕉園敷蓋PE塑膠布

減少管理費用·提高蔗農收益



如需有關詳細資料，請來信向
台灣聚合化學品公司索取即寄
台北郵政信箱22630