

農友經驗



我用水接法嫁接芒果

芒果，是熱帶性果樹。台灣嘉南地區栽培很多，無論園圃，山野或住宅邊，到處都有生長。

在本省，芒果一般都用種子繁殖，因此變種很多，大多變為劣種，而且自萌芽至結果實，必需經過一段極長的時間，不勝麻煩。近來都已改為以現成的劣種芒果樹，加以嫁接而成。

切接法劣點多


嫁接的方法有切接、腹接、靠接、芽接等法。本省多採用切接法，這種方法雖好，可是劣點多，譬如：

- ① 需具有熟練的技術，一般人不易嫁接成活。
- ② 需要選擇適當時期。
- ③ 極怕陽光曝曬，需以乾葉子，塑膠袋包縛。
- ④ 芒果樹膠質重，容易發生弊病
- ⑤ 發芽時間長，成活率低。

水接的方法

現在就以我二十多年來，研究芒果嫁接的經驗——水接法，介紹給大家做參考，其步驟如下：


(一) 準備嫁接的接穗和五〇〇CC瓶子一個，直徑六台分以上的帖木一



- (二) 將接穗離基部四台寸半地方，用切接刀削去表皮二台寸長（如圖一），深達形成層，使成平面，然後，再從砧木離地五台寸處，以切接刀削去表皮二台寸長，面平光滑，深達形成層。（如圖二）
- (三) 將接穗與砧木切口，兩者形成層密切相接，以塑膠帶縛緊即可。（如圖三）
- (四) 以上步驟完成後，再以瓶子盛滿水，需用清水，把接穗基部插入瓶中（如圖三），愈深愈好，其目的為藉以吸收清水養分，並防止枯乾，務必每天換一次清水，以免發臭和基部



圖三



圖二

的腐爛。
(五) 最慢十五天發芽，四十天接穗基部和砧木頂部即可剪斷。於七月中實施，成活率最佳（如圖五）。

優點

- (一) 發芽快，十五天即會發芽，四十天即可獨立成活。
- (二) 成活率高達九〇%，自採用此法後未層失敗。
- (三) 方法簡便，人人都會嫁接。
- (四) 一年中除冬季外，皆可嫁接。
- (五) 不怕炎熱陽光曝曬。

（高雄縣橋頭鄉西林村二二九號 陸季盈）

圖五



圖六



母豬缺乳——如何飼餵仔豬？

仔豬產下，如母豬缺乏乳水，可用嬰兒吃的奶粉代替，先用水沖泡，奶水溫度以攝氏三十七度最適合，如太熱，可放冷，然後裝在給嬰兒吃的乳水瓶中。

將仔豬放在膝蓋上，用奶水飼餵，每天餵五至六次，有時可放入母乳。但要慎防壓斃，這樣三、四天後，再放入小飼槽中，給它吸食。小飼槽可用竹製，這樣約五十天就可離乳。（燕巢鄉尖山村五四之一號董秀雄）