

賽文 SEVIN

經過二年的時間
大家對十四種浮塵子、飛蝨新藥劑
都有了一段深刻的經驗與認識。
比來比去，大家都說：
還是賽文最好。
理由非常顯然
因為賽文最安全
不遺留任何藥臭味於米粒（白飯）
能徹底防治浮塵子、稻飛蝨
且特效最長久
（噴賽文一次等於噴新藥二次）
絕無藥害損傷稻株
最經濟，最合算。
剩餘的賽文來噴霧家園環境
既可保護豬、牛、羊、犬、鷄
且可保家人健康平安
稻米大豐收
各種蔬菜果樹亦大豐收。

歡迎來信索取賽文說明書



UNION CARBIDE CORPORATION

總代理 台灣永備貿易有限公司

通信地址：台北市郵政信箱 12094 號
電話：555211 嘉新大樓總機轉分機 575-578 四線

台灣分代理 興農化工股份有限公司

台中縣大肚鄉中和村中山路

電話：烏日局 100·107 號

*賽文 SEVIN 及 UNION CARBIDE 均為美國永備公司註冊商標。

斤，或硫酸三十公斤。追肥十至十一月上旬施用。

③種苗可向台北市南京西路一六七巷二十一號東方農場洽購。

④每分地需種根三十八至五十五公斤，每分地生根收量一千三百公斤左右。

⑤收穫期在十一月下旬至次年一月間，市價不詳，是一種非常有希望的經濟作物。（徐原田）

魚池施肥要點

「問」：①新開約一甲地的淡水魚池（水源主要為地下水），混養鱖、鯪、鯪、吳郭魚等，使用無機化學肥料，須以何種為宜？
②水深需保持幾尺，才可施用無機化學肥料？

③施肥時間、天氣及其施放量如何配合？

④此種無機化學肥料，是否和普通農業作物所採用者相同？在何處可以購買？價格如何？（台南縣後壁鄉福安村一三三號廖振和）

「答」：①一般池塘使用的化學肥料，為硫酸、過磷酸鈣、及氯化鉀較多，是當做追肥用。基肥則以雞糞或堆肥，兩者配合使用。

②一般池塘的水，能保持三至五合尺，就可以使用化學肥。

③施肥時間以每十天一次，且以氣候良好時施放為宜。如為新池塘其施肥以氮四、磷八、鉀質四的比率就可以。

④因硫酸含氮二十一%，過磷酸鈣含磷十八%，氯化鉀含鉀質五十五

%，就此折合一公頃含有有效肥料成分，為氮一〇·八、四八公斤、磷一七·〇六公斤、鉀九十九·四四公斤。其肥料費用為四千五百六十元，分二十次施放，但天數、施肥量須依季節而增減。

⑤池塘所使用的化學肥料，與農業用者相同，請向貴處農會洽購。（余廷基）

套袋人工授粉

可保品種純正

「問」：①本人所種的木瓜，都選雌花種（母瓜），何以到開花時期，發現雄花蕊占多數？

②現在每年春節期間開花一次，結實不多，請問栽植時，種子、雄花種、雌花種，可有辦法鑑別？（高雄

縣大樹鄉和山村四號陳訓章）

「答」：①因木瓜的花粉，可藉昆蟲及風傳播，長達三十五公里，其自然雜交率極高。若開花前未預先套袋行人工授粉，則附近三至五公里內，若有雄株或遺傳性不良（不連續結果）的兩性株，其花粉就有可能藉由昆蟲和風等，傳至該雌蕊柱頭上，因此雖選雌果採種，後代仍有可能出現雄株或遺傳性不良的兩性株，且品種不純。

②目前木瓜雌雄性別，尚無一正確可靠方法，即不能由種子的部位、大小、重量、苗高、葉形變化、根羣分布等來鑑定性別，但可用人工套袋法完全控制木瓜性別，不但可使後代絕無雄株出現，且可保存品種不致混雜。（王德男）