



生薑加工廠

〔問〕：北部有生薑加工廠嗎？
〔桃園縣內擬自立新村林緯翰〕

〔答〕：本省還沒有專製糖薑或鹽薑的食品工廠，惟兼製糖薑（即蜜餞薑）的工廠則有數家，多設在中部地區，如富兒、泉興、玉山及王子等蜜餞工廠，均設立在彰化縣員林鎮。

兼做鹽薑的工廠，如瑞隆、永豐、福南及喜真果等醃漬食品廠，皆設在台南縣永康鄉，高雄縣市也有數家。（住址參考本刊十五期四十七頁）

至於台北地區有無製造糖薑或鹽薑的食品工廠，則不清楚，請你寫信給台灣省鹽饅工業同業公會（地址：彰化縣員林鎮新生路十二之九號）或台北市醬類工業同業公會（地址：台北市中正路一五七七之八號三樓）洽詢；或逕函台灣省罐頭食品工業同業公會（台北市館前路六十九一七十八號三樓）洽詢。（陳景福）

冬瓜防落果

〔問〕：我在房子前後種植冬瓜，但剛結果後却一個個的萎縮、枯黃、脫落（水分及肥料都不缺少），請問何故？如何防治？（陳克敏）

〔答〕：（冬瓜落果有下列幾點原因：

- (1) 授粉不良，缺少花粉媒介昆蟲，例如無蜜蜂等都會引起落果。
- (2) 在幼虫時受瓜實蠅為害，也會引起落果。
- (3) 種植地點因遮蔭多，陽光照射不良，致植株體內的氮與碳的比率失去平衡，缺碳也會引起落果或着果不良等現象。

防治方法：

- (1) 對於第一原因，可實施人工授粉，授粉時間須在早晨，並注意不傷及幼果的絨毛，否則幼果不但發育不好，甚至落果。
- (2) 對於第二原因，應於雌花出現時，噴射二十五多馬拉松可濕性粉劑，和水溶性蛋白質混合液四百倍，每隔四—五天噴射一次，噴射時無須全面噴射，僅作誘殺。
- (3) 對於第三原因，應選陽光照射良好的地點，栽培冬瓜為宜，並需疎蔓。（王進生）

鳳梨園噴殺草劑

〔問〕：鳳梨是否能噴殺草劑？若能噴施，請問用何種藥劑最為理想？（雲林縣虎尾鎮與南里廿八號沈清泉）

〔答〕：鳳梨可用殺草劑噴施，藥劑名稱及使用量如左：

- (一) 五十多草脫淨可濕性粉劑，每公頃用藥量—全面噴藥四至六公升，畦間噴藥三至四公升，稀釋二百至二百五十倍。
- (二) 八十多達有龍可濕性粉劑，每公頃用藥量—全面噴藥二至三公升，畦間噴藥一·五至二公升，稀釋四百

至五百倍。

〔三〕以上兩種藥劑，宿根性雜草不受控制，鳳梨生育中如有枯骨草及其他雜草旺盛，無法去除時，可噴施八十多克草可濕性粉劑，每公頃用藥量五公升，稀釋三百倍。（席台麗）

柑園間作金針

可免表土流失

〔問〕：（一）柑桔園種植金針菜，是否會引起病虫害？

〔溫州蜜柑（早生）用何種砧木較理想？

〔中部地區是否適宜栽培？

〔何處可購種苗？（兩投信義鄉明德村中平巷四十六號張金龍）

〔答〕：（一）柑桔與金針菜間作，不會發生病虫害，但金針菜吸收肥分力強，須增肥料量。

金針菜開花期，對柑桔株最好不噴毒性較強農藥，以免發生中毒現象。金針菜種植柑桔園梯（階段）邊時，不但可免上述缺點，並可防止表土流失。

〔溫州蜜柑（早生）以枳壳砧較好，枳壳與早生溫州蜜柑間的親和性雖非最好，但枳壳砧溫州蜜柑，果實的品質優良，早熟最適於栽培。埔里鎮也有人以廣東寧蒙，作為早生溫州蜜柑砧木，成績相當良好，但果實品質不如枳壳砧者，製罐品質較差。

〔中部地區如高海拔地區（六百—八百公尺），照常可以種植；低海拔地由於冬季氣溫過高，不適栽培。

〔溫州蜜柑因近年來栽培者少，本省無可靠苗圃繁殖，請自播枳壳種子，選擇優良品種溫州蜜柑，接穗嫁

BEST GREEN

★★★台灣省政府農林廳登記農肥字第0111號★★★

不二價

原裝進口 500cc 100元

1000cc 100元

250cc 35元

興達化工廠出品

最好綠 NO.2

原料自日本進口

促使農作物迅速茁長成熟之最佳植物營養劑

○使用濃度 ○○倍 ○○○倍

○比其他的藥劑省錢

○最通用

○最佳植物營養劑

○最成熟之果樹類

○蔬菜類

○水蘆薈

○香蕉

○莖類

○瓜類

○花卉類

○二〇〇〇倍