



### 栽培仙人掌

#### 防馬蟻為害

〔問〕：仙人掌燒病如何防治？  
〔答〕：仙人掌口燒病，表面上看似日燒，但可能是虫食根部，或過乾過濕傷害根部所引起。

因為仙人掌喜強光，單純日曬不會引起日燒。仙人掌栽培上應防蟻類為害，所有虫害均可由馬蟻而生。（杜廣銓）

### 種豬的選擇

〔問〕：（種豬選擇上應考慮什麼？）  
〔答〕：（種豬的好壞，僅憑外形的鑑別是不可靠的，必須同時考慮能力來選擇。

（1）應先明白該豬種為何？是純種或雜種？如果是純種的話，牠的外貌是否具備該品種的特徵？如果是雜種，牠的外貌是否具備雜交的特徵。  
（2）豬的能力，一代傳一代，好種相傳。購買時最好在可靠而大規模的養豬場購買，因為這些養豬場都有詳細的生產記錄。如果沒有紀錄，你可

以親自觀察哺乳後的仔豬，由這些仔豬羣中，選擇發育良好而整齊的最大小母豬，牠的後代一定是優秀的。  
（3）身體要強壯，後腿要發達，四腳強健長而直，背後不能太凹，最好是平坦或稍凸。

（4）乳頭要有六對以上，七對更好，這樣才能哺乳仔豬十二頭以上。每頭乳頭大小及距離要均勻，盲乳（小乳頭不分泌乳汁）或凹乳頭者不要做種豬。  
（5）要選擇性情溫順的，性情急躁的母豬，哺育仔豬的成績較差。  
（6）豬舍日常管理工作繁多，主要注意事項如下：  
（1）豬舍要夏涼冬暖，注意通風，所以建豬舍要先考慮地點。  
（2）日常保持豬舍的清潔及乾燥（尤以小豬為重要）。豬的性質為小豬怕冷，大豬怕熱；又小豬怕水，大豬愛水。  
（3）經常供應清潔的飲水。  
（4）夏天悶熱時，豬體須沖水，以便保持豬體的清潔及涼快。  
（5）不要餵飼酸敗變質的飼料，以免反胃。  
（6）豬舍應定期消毒，每月至少一次。（張聯欣）

〔問〕：（芥藍菜種子將來外銷前途如何？）  
〔答〕：芥藍菜種子將來外銷前途如何？  
（芥藍菜如何栽培？）（嘉義縣義

### 外銷種子 須先登記

〔問〕：（芥藍菜種子將來外銷前途如何？）  
〔答〕：芥藍菜種子將來外銷前途如何？

### 竹鄉義竹村九十六號翁正昇

〔答〕：（芥藍菜種子生產以嘉義為多，栽培方法為：  
（1）直播：九月下旬下種，每十公畝播種量約六台兩，較一般栽培播種，然後間拔至株距二十公分左右。  
（2）移植：九月中旬下種，九月下旬十月上旬定植。行距五十公分，株距二十五—三十公分，栽植株數七千—八千株。管理與花椰菜略同，病虫害防治，亦與甘藍、花椰菜相同。每分地種子採收量，視每年的氣溫及栽培管理而定，約可採收三十一—五十公斤，每公斤批發價格三十元左右。

（若想專為外銷而生產，則須向農林廳登記，並須接受農林廳種子檢查室人員的檢查，認為符合標準才能外銷。（王進生）

### 皇帝豆栽培法

〔問〕：秋季種皇帝豆，行株距多少？有何病虫害？何種藥劑可防治？每十公畝施多少肥料？（屏東縣九如鄉九明村四三四蔡明達）  
〔答〕：（皇帝豆有蔓性種及矮性種，所以行株距各有不同：  
（1）蔓性種：行距三公，株距一—一·五公尺。  
（2）矮性種：行距〇·六公尺，株距〇·四公尺。  
每穴播二粒種子，矮性種可將二行成爲一畦，蔓性種以單畦爲原則。  
（3）每十公畝施肥量如下：  
堆肥—一千五百—二千公斤（基肥）。  
硫酸銨—五十—六十公斤（一半

爲基肥，一半爲追肥，分三次施用）  
過磷酸鈣—六十—七十公斤（五分之三爲基肥）。  
氯化鉀—三十—三十二公斤（二分之一爲基肥）。  
（4）病虫害與菜豆（敏豆）相同，常見的有炭疽病、葉燒病等，宜噴射「大生」四百倍液。  
虫害以夜盜虫、紅蜘蛛、蚜虫、潛莖蠅等，請參考植物保護推廣方法。（王進生）

註冊商標

有了中川牌噴水器就不怕天不下雨，能爲你最滿意的噴水灌溉如下雨一樣的均勻，省工、便利、價廉、請多多採用，最新式的噴水灌溉。

60型 管子牙  
30型 管子牙  
20型 管子牙

3公斤的水  
30公升  
有壓差  
每分鐘  
噴水  
40公升

2公斤的水  
20公升  
有壓差  
每分鐘  
噴水  
30公升

1公斤的水  
10公升  
有壓差  
每分鐘  
噴水  
15公升

中川機械工廠出品 台中縣豐原鎮翁西路12號