

枇杷品種與栽培

丁俊傑

枇杷原產我國南部，本省現種的在來種，是早年由大陸傳來，經實生繁殖而成的。過去在苗栗縣頭份鎮的緩坡地帶栽培很多，但是品質較差。至日本占據台灣後，從日本輸入中、茂木等優良品種，初在新竹縣角

板山試種，頗為成功，後傳至本省中北部各地栽培。據台灣農業年報民國五十八年版統計，本省五十七年枇杷栽培面積達五〇五公頃，收穫量較多的地區為新竹縣、苗栗縣、台中縣、彰化縣、南投縣等地。

以上各地區所以出產枇杷較多原因，主要是由於該地區在枇杷開花結果期間，氣候適合及土質良好。

氣候

枇杷性喜溫暖，花果在冬季發育，因此冬季溫度不宜過高過低，降雨多濕度過高地區，易使枝梢徒長，結果不佳，果實色澤變劣，甘味減少。

土壤

枇杷栽培土壤以砂質壤土、礫質粘土或礫質壤土，尤在重粘土混有砂

礫或心土帶有砂礫者最好。若栽培在排水良好乾燥地區，結果多而味甘，易早熟。反之，果實酸味增加。

栽培

枇杷雖可在平地及傾斜地栽培，但仍以選擇微傾斜地最好。傾斜方向以向東、向東南、向南為佳。如果在光淺較少處栽培，樹體生長軟弱，所產果實毛茸厚，色澤不佳，味酸、品質也較劣，成熟期延遲。如在地帶栽培，應有防風牆設置，有時由於夏季乾燥或樹體不甚旺盛時，往往使發育枝的新梢生長受抑制，易變成結果枝的現象，往往造成第二年結果增加的現象。

也有由於早期乾旱，使枝梢早日停止生長，促進花芽的形成，後來由於灌溉或雨水較多關係，使部分枝條在九月即抽出結果枝，而提早開花的現象。但是正常開花期應在十一月左右，在此時開花所結果實，日後產量及品質均為上品。

品種

本省目前所栽培的枇杷品種，經調查結果可分為四種：

(一)茂木：約在十九世紀，由中國商船將一批枇杷果實由中國大陸運至日本長崎，經三浦喜本氏在茂木町將果實種子播種實生而得茂木種枇杷。果實為倒卵形，較田中為小，普通果重四〇至五〇公克，大的不超過六〇至七〇公克。

外皮橙黃色，較薄，易剝離，果肉亦為橙色，柔軟多汁，甘味強，酸味很少，果肉含種子約二至三粒，品質優良，成熟期較田中稍早，為生食

原裝進口，現貨供應！



英國卜內門公司附屬植物保護公司新出品
專治蚜虫、潛葉蛾特效藥品的

新“賽福施”

Sayfos'70-S

* 低毒無臭 · 人畜安全

* 持久浸透 · 作物無害

農藥財發

嘉泰企業股份有限公司

地址：台北市仁愛路三段26號2樓 電話：776815, 782796



《詳細說明書備索》農林廳農藥字第309號