



梨桃施肥要點

〔問〕：(一)何時為梨及桃的花芽形成期？

(二)梨及桃的施肥方法如何？每年如何分配施肥次數？

(三)施用何種肥料為佳？(台中縣豐原鎮翁明里翁西路十二一七號王登科)

〔答〕：(一)正常生育情形下，梨樹五年可開始結果，桃樹三年開始結果。

梨花芽着生於短枝頂端，桃花芽着生於長枝兩側的葉腋，大都於前一年七、八月高溫期分化而成，於冬季落葉後即能明確辨認。

(二)梨桃施肥原則大致相同，小樹宜環施，大樹可穴施或撒施，惟皆應注意勿損傷根部為要。

有機肥應於一、二月間早施，化學肥則在發芽前、花謝後、果實肥大期及採收後分次施入，效果較好。

梨樹落葉問題

〔問〕：(一)梨樹休眠期零星落葉，又零星發芽，是否可施藥讓它一次完全落葉，一齊開花？如何才能提高產量及防止落果？

(二)桑園間作地瓜，是否影響產量？使用何種除草劑較理想？

(三)蘆筍(石刁柏)用何種除草劑，才不會影響產量？(台東縣池上鄉福原村新生路一〇〇號曾其順)

〔答〕：(一)梨樹正常的生長，應於陽曆十二月以後完全落葉，三月以後重新萌芽、開花，貴處海拔過低，冬季溫度不足，故有此種不正常的現象。

補救方法，可於十二月噴布高級夏油一次，一月嚴格實施冬季剪定，及大量施用有機肥(如堆肥、廐肥、雞糞)。

凡八、九月間所開的花果，均應清除，以促進明年春季正常的開花和結果。

(二)梨園間作地瓜，若在樹冠垂直之外側，原則上不影響梨根生長，反之直接種在梨樹之下，因搶奪肥分關係，必影響梨之產量。

(三)目前除草劑，主要應用於無間作物果園空地雜草，或在短期作物栽種之前，先行施用殺草劑，凡在栽培作物(如地瓜、石刁柏)中施用除草劑，均同樣遭受損害。(李信芳)

柑桔缺硼症

〔問〕：(一)柑桔缺硼砂症，何時噴施葉面最有效？與何種農藥可以混合？

(二)碧雲石粉製成的石灰，含有什麼成分？柑桔園PH五·六土壤，一公頃施用多少最合適？

(三)毒線虫什麼時候處理最適合？

1970年日本、美國等各種新子已到齊
長岡夕井會社產品
60日甘藍、無雙白菜等各種 現貨供應
天理大和農園產品

巨豐菠菜 本品種生長快，可在八月至三、四月間隨時播種，比其他品種產量高數倍。
ミカサ菠菜 一代交配種，綠皮、黑花紋、肉鮮黃
小玉西瓜 子少甘味甜度高，每粒重1.5公斤
ニユーメロ香瓜 綠皮、抗病強、色光澤、結球多
金力甘藍 金城甜瓜 四葉胡瓜 縞王西瓜
◎秋季新到 草花種子 四十餘種原封包，上記皆精美繪袋包裝防濕，保證品種可靠，歡迎選購。


◎裕興新一號(煙台力八)卷心白菜
本品種原係本產黑葉包心白與日本煙臺交配育成之新一
代早生純黑葉包心白，自正月至十二月間週年隨時播種
極容易栽種，菜株強健結球完全包被，耐寒、霽雨不腐
爛抗病力強，食味俱佳，冬期播種65天可收成每球一公
斤半以上，暑期高溫下直播55-60天可收，每球二公斤
者賞識之新品種。(試作附郵一元即寄、每台兩60元、
三兩罐裝)

美國產品：加州甜椒、大心萵、大球、小球、青花苔、西洋芹菜、洋蒜、蕪菁、甜菜
6811人參、366、5022生菜

新裕興企業股份有限公司
新合成種子行
台總代理
台北市迪化街一段一四九號
台灣郵政畫撥：502號 TEL: 543787



新和優良種子



自營生產：一代交配西瓜、蕃茄、甘藍、花椰菜、白菜、胡瓜等各種優良品種。
代理經銷：日本藤田會社大五寸人參及各種優良品種，日本夕井會社長岡交配各種蔬菜優良品種。
進口批發：國內外優良蔬菜、瓜菜、花卉、綠肥種子。

生產、進出口、批發、零售

新和種子行

新和研究農場
嘉義市西門街95號(國際戲院對面北角)
電話：3479 郵政劃撥：31962