農業信箱

梨桃施肥要點

【問】：㈠何時爲梨及桃的花芽形成期？㈡梨及桃的施肥方法如何？每年如何分配施肥次數？㈢施用何種肥料爲佳？（台中縣豐原鎮翁明里翁西路十二—七號王登科）

【答】：㈠正常生育情形下，梨樹五年可開始結果，桃樹三年開始結果。

梨花芽着生於短枝頂端，桃花芽着生於長枝兩側的葉腋，大都於前一年七、八月高溫期分化而成，於冬季落葉後即能明確辨認。

㈡梨桃施肥原則大致相同，小樹宜環施，大樹可穴施或撒施，惟皆應注意勿損傷根部爲妥。

有機肥應於一、二月間早施，化學肥則在發芽前、花謝後、果實肥大期及採收後分次施入，效果較好。

㈢有機肥可使用雞糞、堆肥等，化學肥料可用尿素、硫銨、過磷酸石灰、氯化鉀等。（李信芳）

梨樹落葉問題

【問】：㈠梨樹休眠期零星落葉，又零星發芽，是否可施藥讓它一次完全落葉，一齊開花？如何才能提高產量及防止落果？㈡桑園間作地瓜，是否會影響產量？使用何種除草劑較理想？㈢蔗筍（石刁柏）用何種除草劑，才不會影響產量？（台東縣池上鄉福原村新生路一〇〇號曾其順）

【答】：㈠梨樹正常的生長，應於陽曆十二月以後完全落葉，三月以後重新萌芽、開花，貴處海拔過低，冬季溫度不足，故有此種不正常的現象。

補救方法，可於十二月噴布高級夏油一次，一月嚴格實施冬季剪定，及大量施用有機肥（如堆肥、廐肥、雞糞）。

凡八、九月間所開的花果，均應清除，以促進明年春季正常的開花和結果。

㈡梨園間作地瓜，若在樹冠垂直之外側，原則上不影響梨根生長，反之直接種在梨樹之下，因搶奪肥分關係，必影響梨之產量。

㈢目前除草劑，主要施用於無間作物果園空地雜草，或在短期作物栽種之前，先行施用殺草劑，凡在栽培作物（如地瓜、石刁柏）中施用除草劑，均同樣遭受損害。（李信芳）

柑桔缺硼症

【問】：㈠柑桔缺硼沙症，何時噴施葉面最有效？與何種農藥可以混合？㈡碧雲石粉製成的石灰，含有什麼成分？柑桔園PH五•六土壤，一公頃施用多少最合適？㈢毒線虫什時候處理最適合？（

註冊商標 新和優良種子



自營生產： 一代交配西瓜、蕃茄、甘藍、花椰菜、小菜、胡瓜等各種優良品種。

代理經銷： 日本藤田會社大五寸人參及各種優良品種，日本タキイ會社長岡交配各種蔬菜優良品種。

進口批售： 國內外優良蔬菜、瓜菜、花卉、綠肥種子。

生產、進出口、批發、零售

新和種子行

新和研究農場

嘉義市西門街95號（國際戲院對面北角）

電話：3479　郵政劃撥：31962

1970年日本、美國等各種新子已到齊

長岡交配 タキイ種苗會社產品

60日甘藍、無雙白菜等各品種　現貨供應

天理交配 大和農園產品

巨豐菠菜 ｜本品種生長快，可在八月至三、四月間隨時播種，比其他品種產量高數倍。

ミカサ菠菜 ｜

小玉西瓜 一代交配種，綠皮、黑花紋、肉鮮黃、子少甘味甜度高，每粒重 1.5公斤

ニューメロン香瓜 綠皮、抗病強、色光澤、結球多

金力甘藍　金城甜瓜　四葉胡瓜　纏王西瓜

◎秋季新到**草花種子** 四十餘種原封包，上記皆精美繪袋包裝防濕，保證品種可靠，歡迎選購。

◎**裕興新一號（煙台カバ）卷心白菜**

本品種原系本產黑葉包心白與日本煙臺交配育成之新一代早生純黑葉包心白，自正月至十二月間週年隨時播種極容易栽植，菜樣强健結球完全包被，耐寒、霪雨不腐爛抗病力强，食味俱佳，冬期播種65天可收成每球一公斤半以上，暑期高溫下直播55—60天可收，每球二公斤左右，十成收穫爲其特性，全天候之優越品種，爲消費者賞識之新品種。（試作附郵一元即寄，每台兩60元、三兩罐裝）

美國產品： 加州甜椒、大心萵、大球、小球、青花苔、西洋芹菜、洋蒜、蕪菁、甜菜6811人參、366•5022生菜

台灣總代理

新裕興企業股份有限公司

新合成種子行

台北市廸化街一段一四九號

台灣郵政劃撥：502號　TEL. 543787