

花蓮縣光復鄉大平村一三二之一號金印)

【答】：(一)柑桔缺硼症治療方法如下：

(1)硼素劑○·一—○·二%液，於二至三月間撒布葉面最好，如無法在該時間噴射時，雖也可以延至七月間，但濃度宜薄。

硼素劑不可與水銀劑或石灰硫黃合劑混用。

(2)硼砂或硼酸，每分地施用十公斤左右也有效，但不能在乾燥時期施用。

(一)白雲石粉的成分為： MgO —九·九七%， CaO —三五·九九%， Al_2O_3 —〇·八九%， Fe_2O_3 —二·一%， SiO_2 —九九·九%，燃燒損耗—三九·九四%。

柑桔土壤的適宜酸度為PH五·五—六，PH五·六土壤不必施用，若要施用時，每分地不得超過五十公斤。

(二)毒線虫在地溫攝氏十度以下時，噴藥效果低且易發生藥害，應該在春天或夏季時施用，土壤過乾或過濕時，要避免施用。(翁仁祿)

雞蛋孵化比較

【問】：(一)家禽孵化與人工孵化各有何利弊？

(二)家畜火傷如何處理？(馬祖南竿郵政七四三四附十九號蔡英茂)

【答】：(一)家禽(雞)天然孵化與人工孵化各有利弊，茲列表如左請參考。

1. 簡便，不需要技術及勞力。	1. 複雜，需要技術及勞力。
2. 設備簡單。	2. 需要複雜的設備(孵化器、供電系統)。
3. 一次孵化數目少，適合於小農戶。	3. 一次孵化數目多，可得一樣品質的小雞，適合於大規模雞場。
4. 對疾病及外寄生蟲的控制不容易。	4. 容易做到疾病控制，不致有外寄生蟲。
5. 母雞不易找，有的母雞半途即停止抱蛋。	5. 遇到停電就很麻煩。

天然孵化 人工孵化

(二)輕度受傷而範圍小者，可用苦味酸飽和液(Picric acid)，或一千倍過錳酸鉀液(包)；受傷程度嚴重(傷及肌肉或骨者)且範圍廣泛者，應注意防止受傷組織的細菌感染，以磺胺劑或抗生素防止感染。(劉永和)

辣椒性喜陽光

【問】：(一)在小果樹行間種植小辣椒，小辣椒易感染那些病？用什麼農藥噴施有效？果樹是否會受影響？(二)剛發芽至一呎高，要施用什麼化學肥料？結果後又需施用那種化學肥料？

(三)小辣椒已經開始開花，但花很少，葉面有枯黃的現象，好像營養不良，究竟是缺肥或有病？(屏東市楠樹里振興巷二一號萬源生)

【答】：(一)辣椒性喜陽光，所以在遮蔭下生育開花着果較差，易出毒素病和疫病等，適當的施肥及灌水，



鳳梨園敷蓋PE塑膠布
植株生長好·鳳梨產量高



如需有關詳細資料，請來信向台灣聚合化學品公司索取即寄
台北郵政信箱22630

韓國 興農種苗株式會社

最新育成新品種

興農交配 佛岩越夏甘藍

◎依照長岡交配初秋及天理交配金力之栽培法育成，而比初秋，金力更佳。

興農交配 佛岩耐病60日白菜

興農交配 佛岩夏蒔白菜

◎徵求篤農家試作，附郵票一元索取樣品即寄。(樣品索完為止)

◎如將試作，報告本公司者可再贈送種子。

總代理 義聯貿易股份有限公司

大信種子行 台北市迪化街一段221號
根益種子行 三重市三和路三段5號

台北市迪化街一段221號 電話：541859 541937