



# 切花之王

## 火鶴花

• 謝克昌 •

火鶴花是屬於天南星科灌木狀多年生的植物，學名 Anthurium Schottii，英文名為 Tail Flower 或 Flamingo Plant，為熱帶美洲之原種，品種有二〇〇種左右，其中有觀賞花苞及觀葉兩大系統，可供切花及盆栽觀賞。

植株分有莖與無莖兩種，其中也有蔓性者。葉部常帶綠色革質。花苞有蛋圓柱形、橢圓形及尖形，中間生出一支肉穗花序，花序與花苞同長，大部分為圓柱形，也有二重花苞的重瓣花形。花色有五羣，即紅、橙紅、粉紅、珊瑚色及白色等，另有白斑及白底有色斑等，品種繁多。現在以其

渣、水苔等也很理想。在夏威夷是利用蔗渣做材料，分為新鮮蔗渣及腐熟蔗渣。如五個月、九個月、一三個月等三種不同腐熟程度的腐肥，據其試驗結果，經過一三個月處理的腐熟蔗渣最理想。用木屑一年加六次肥料的不成績也良好，種植材料隨着地區的不同而不同。本場用水苔加少量（約二

花苞的長度及寬度盡分為極小型、小型、中型、大型及極大型等五種。火鶴花之所以成為夏威夷的重要切花事業，因火鶴花切花後，插在花瓶上可維持四星期以上。

火鶴花原生長於熱帶，因此必須一年間經常有高溫多濕的環境，生長才會良好，普通二年換植一次。火鶴花的生長溫度不能低於攝氏一八度以下，日間溫度為攝氏二七度為最理想。此種植物對栽培遮光甚為重要，遮光程度與植物年齡、栽培地點的氣候環境等有很大關係，通常遮光度以五〇—九〇%為理想。在種苗繁殖場試驗結果，六六%的光度也甚為理想。

種植材料有數種，一般用粗木鉋花加土及厩肥等為材料，蛇木屑、泥炭苔及蔗

台灣農產企業公司・日本みかど育種農場

### 技術合作優良西瓜種籽現貨供應

台農交配	新富寶西瓜	台農交配	新小鳳西瓜
台農交配	黑富寶西瓜	台農交配	小鳳無籽西瓜
台農交配	新富光西瓜	台農交配	紅雀西瓜
台農交配	旭都西瓜	（紅肉小玉）	
台農交配	新蜜寶西瓜	高農交配	黃鶯小玉西瓜
台農交配	蜜寶無籽西瓜		

其他美國，日本產各種蔬菜種子齊備  
八江新黑田五寸人參現貨供應

台北市迪化街一段八十六號  
台灣農產企業公司

高山種苗株式會社 為高農交配こがね（黃金）小玉西瓜（即黃鶯西瓜）敬告農友啟事：

茲本社育成之こがね小玉西瓜，二年來委託台灣農產企業公司在台經銷，因草勢強健旺盛，耐病性强，一株可收穫十五—二十果，每果二公斤重之豐產種。優良的縱縐紋、亮皮、皮薄而堅，肉質甜嫩、濃黃金色、味好、籽少，品質最優，到處受人歡迎。

目前黃鶯種子，本社僅委託台灣農產企業公司以繪袋包裝，印有台灣總代理 台灣農產企業公司字樣。現在南部發現有仿印高農こがね小玉西瓜的繪袋冒充本社產品出售，敬請顧客注意，以免誤購影響生產為幸。

日本京都市北區紫竹下線町  
高山種苗株式會社 謹啟

至三(多)蛇木屑，生長情形極佳。火  
 鶴花一般用無性繁殖，即分株法，如  
 果根部高長在莖上部時，即可切離分  
 植於新盆內使其發芽，餘下的根部即  
 可發出一或二新芽，此方法可繼續繁  
 殖大量的同一系統。有性繁殖只限於  
 育種，自播種至開花需要三年以上的  
 時間。在田間繁殖，株行距各四五公  
 分，每分地可種植四八〇〇株左右。  
 如用盆栽，大型者種在六寸盆，小型  
 者種在五寸盆即可。

施肥量每株施用一湯匙六。〇一  
 一四。〇一七。五的氮磷鉀的混合肥  
 料，每二個月施用一次。如用較為通  
 氣的材料種植時，每月可施用一次。  
 在夏威夷每株火鶴花每年可剪五  
 至八朵花。病害有苞面黑斑病、紋病  
 及根腐病等。虫害有蚜虫、薊馬及蝗  
 虫等，可噴射適當的農藥防治。

台灣的氣候溫暖，適合栽培火鶴  
 花，只需有遮光及避風(特別是夏季  
 颱風時)等適當的設備，即可種植，  
 以銷售國外，爭取外匯。

### 胡蝶標本製作

●張良傳●

胡蝶標本的製作方法如下：

- (一)採集——用捕虫網採集，要注意  
 胡蝶的翅膀不能弄破，然後用三角紙  
 包好並輕壓胸部，使其呈暈迷狀態，  
 經過一、二天，使胡蝶肚中物完全消  
 化(不可等到死硬，否則無法展翅)  
 再取出，然後在展翅板上展翅。
- (二)展翅——先將胡蝶用昆虫針，自  
 胸部向下穿插，然後固定於展翅板橫

溝上，再用昆虫針慢慢地展翅。翅須  
 用玻璃紙壓平，紙上用大頭針固定，  
 使展翅不會移動，並注意上下翅要成  
 十字形，觸角要弄平直。

(三)風乾——做好放在展翅板上的胡  
 蝶標本，須經電乾燥箱風乾或日光曝  
 曬，充分乾燥後才可取掉壓紙。

(四)保存——經風乾後的胡蝶標本，  
 須用標本盒保存。標本盒內須放置樟  
 腦丸或粉密封，或放PDB粉或用小  
 瓶裝福馬林等防腐劑液才可保存。

### 木瓜問題

——王德男

(一)木瓜開花和結果，除受本身遺  
 傳因子的支配外，還受環境因素的影響。  
 一般雌株都不能結果(少數品種  
 在秋冬季節，能於花序頂端結一至二  
 個小果)。有無遺傳因子不良的兩性  
 株，在高温高濕或低溫下，常開不實  
 的兩性花(似雄花)或畸形果花，致  
 無結果，此種樹型，僅在春季開花，  
 結果始能正常。

除以上兩種原因外，土壤、水分  
 、養分、病虫害及授粉不良，也能導  
 致開花不結果。

(二)木瓜多施堆肥等有機肥料，不  
 但對土壤有改良作用，且對品質也有  
 很大效應。氮、磷、鉀三要素中以磷  
 肥最重要，其配合比率為氮：磷：鉀  
 為四：八：五。

木瓜栽培法，請參閱豐年第二十  
 卷二十期。

嘉義縣新港鄉安和村一三八號吳  
 淑媛農友來函問：有關木瓜問題，請  
 參考。

# WUCHSAL

# WUCHSAL

## 好消息!!

## 報您豐收大賺錢

正豐露!!最新葉面營養劑

能使您增加收成20%以上



250c.c.



1,000c.c.

正豐化學公司  
 台中縣霧峯鄉民生路200號  
 電話：63·163

適用作物及使用方法：

種類	作物名稱	使用濃度	施後效果
木 稻	在米、落葉	五〇〇/八〇〇倍	缺苗耐寒霜增強抗病預防力 發芽，增加產量
果 實 類	柑桔、葡萄、香蕉、荔枝 梨、梅、枇杷、鳳梨、櫻 桃、荔枝、櫻桃等。	新植幼苗 八〇〇倍 成株以五〇〇倍	成活力高，開花迅速，枝葉 茂盛，防止落果，增加 產量，耐貯運。
瓜 類	西瓜、西瓜、小玉仔等瓜類	五〇〇倍	對病抵抗強。
蔬 菜 類	菠菜(花)、洋蔥、豆類 馬鈴薯、蕃茄	五〇〇倍	促進生長發育，耐濕性特強
經 濟 作 物	麻竹、洋菇、棉花	五〇〇倍	保水力强，結果潔白，生產 力增高，病害抵抗力增強。
觀 賞 花 卉	玫瑰、蘭花	五〇〇/一〇〇〇倍	花色鮮艷，持久不變。