

至三(多)蛇木屑，生長情形極佳。火鶴花一般用無性繁殖，即分株法，如果根部高長在莖上部時，即可切離分植於新盆內使其發芽，餘下的根部即可發出一或二新芽，此方法可繼續繁殖大量的同一系統。有性繁殖只限於育種，自播種至開花需要三年以上的時間。在田間繁殖，株行距各四五公分，每分地可種植四八〇〇株左右。如用盆栽，大型者種在六寸盆，小型者種在五寸盆即可。

施肥量每株施用一湯匙六。〇一四。〇一七。五的氮磷鉀的混合肥料，每二個月施用一次。如用較為通氣的材料種植時，每月可施用一次。在夏威夷每株火鶴花每年可剪五至八朵花。病害有苞面黑斑病、紋病及根腐病等。虫害有蚜虫、薊馬及蝗虫等，可噴射適當的農藥防治。

### 胡蝶標本製作

●張良傳●

胡蝶標本的製作方法如下：

- (一)採集——用捕虫網採集，要注意胡蝶的翅膀不能弄破，然後用三角紙包好並輕壓胸部，使其呈暈迷狀態，經過一、二天，使胡蝶肚中物完全消化(不可等到死硬，否則無法展翅)再取出，然後在展翅板上展翅。
- (二)展翅——先將胡蝶用昆虫針，自胸部向下穿插，然後固定於展翅板橫

溝上，再用昆虫針慢慢地展翅。翅須用玻璃紙壓平，紙上用大頭針固定，使展翅不會移動，並注意上下翅要成十字形，觸角要弄平直。

(三)風乾——做好放在展翅板上的胡蝶標本，須經電乾燥箱風乾或日光曝曬，充分乾燥後才可取掉壓紙。

(四)保存——經風乾後的胡蝶標本，須用標本盒保存。標本盒內須放置樟腦丸或粉密封，或放PDB粉或用小瓶裝福馬林等防腐劑液才可保存。

### 木瓜問題

——王德男

(一)木瓜開花和結果，除受本身遺傳因子的支配外，還受環境因素的影響。一般雌株都不能結果(少數品種在秋冬季節，能於花序頂端結一至二個小果)。有無遺傳因子不良的兩性株，在高温高濕或低溫下，常開不實的兩性花(似雄花)或畸形果花，致無結果，此種樹型，僅在春季開花，結果始能正常。

除以上兩種原因外，土壤、水分、養分、病虫害及授粉不良，也能導致開花不結果。

(二)木瓜多施堆肥等有機肥料，不但對土壤有改良作用，且對品質也有很大效應。氮、磷、鉀三要素中以磷肥最重要，其配合比率為氮：磷：鉀為四：八：五。

木瓜栽培法，請參閱豐年第二十卷二十期。

嘉義縣新港鄉安和村一三八號吳淑媛農友來函問：有關木瓜問題，請參考。

WUCHSAL

WUCHSAL

好消息!!


報您豐收大賺錢

正豐露!!最新葉面營養劑

能使您增加收成20%以上



250c.c.



1,000c.c.

正豐化學公司  
台中縣霧峯鄉民生路200號  
電話：63·163

適用作物及使用方法：

種類	作物名稱	使用濃度	施後效果
木類	在果、落葉	五〇〇/八〇〇倍	缺苗耐寒霜凍病若預防力，植株旺盛，結實肥實，霜後增加產量。
果實類	柑桔、葡萄、香蕉、荔枝、梨、梅、枇杷、鳳梨、檸檬、蕃石榴、櫻桃等。	新植幼苗 八〇〇倍 成株以五〇〇倍	成活力高，開花迅速，枝葉茂盛，防止落果，增加產量，品質優良，增加結果飽滿，耐熱較強，植株對病抵抗力量。
瓜類	西瓜、西瓜、小玉仔等瓜類	五〇〇倍	促進生長發育，耐濕性特強
蔬菜類	菠菜(花)、洋蔥、豆類、馬鈴薯、蕃茄	五〇〇倍	保水力量，結果潔白，產力增高，病害抵抗力量強。
觀賞植物	康乃、洋菇、棉花	五〇〇倍	花色鮮艷，持久不變。
觀賞花卉	玫瑰、蘭花	五〇〇/一〇〇〇倍	