

至三(多)蛇木屑，生長情形極佳。火
 鶴花一般用無性繁殖，即分株法，如
 果根部高長在莖上部時，即可切離分
 植於新盆內使其發芽，餘下的根部即
 可發出一或二新芽，此方法可繼續繁
 殖大量的同一系統。有性繁殖只限於
 育種，自播種至開花需要三年以上的
 時間。在田間繁殖，株行距各四五公
 分，每分地可種植四八〇〇株左右。
 如用盆栽，大型者種在六寸盆，小型
 者種在五寸盆即可。

施肥量每株施用一湯匙六。〇一
 一四。〇一七。五的氮磷鉀的混合肥
 料，每二個月施用一次。如用較為通
 氣的材料種植時，每月可施用一次。

在夏威夷每株火鶴花每年可剪五
 至八朵花。病害有苞面黑斑病、紋病
 及根腐病等。虫害有蚜虫、薊馬及蝗
 虫等，可噴射適當的農藥防治。

台灣的氣候溫暖，適合栽培火鶴
 花，只需有遮光及避風(特別是夏季
 颱風時)等適當的設備，即可種植，
 以銷售國外，爭取外匯。

* * *

胡蝶標本製作

●張良傳●

胡蝶標本的製作方法如下：

- (一)採集——用捕虫網採集，要注意
 胡蝶的翅膀不能弄破，然後用三角紙
 包好並輕壓胸部，使其呈暈迷狀態，
 經過一、二天，使胡蝶肚中物完全消
 化(不可等到死硬，否則無法展翅)
 再取出，然後在展翅板上展翅。
- (二)展翅——先將胡蝶用昆虫針，自
 胸部向下穿插，然後固定於展翅板橫

溝上，再用昆虫針慢慢地展翅。翅須
 用玻璃紙壓平，紙上用大頭針固定，
 使展翅不會移動，並注意上下翅要成
 十字形，觸角要弄平直。

(三)風乾——做好放在展翅板上的胡
 蝶標本，須經電乾燥箱風乾或日光曝
 曬，充分乾燥後才可取掉壓紙。

(四)保存——經風乾後的胡蝶標本，
 須用標本盒保存。標本盒內須放置樟
 腦丸或粉密封，或放PDB粉或用小
 瓶裝福馬林等防腐劑液才可保存。

木瓜問題

——王德男

(一)木瓜開花和結果，除受本身遺
 傳因子的支配外，還受環境因素的影響。
 一般雌株都不能結果(少數品種
 在秋冬季節，能於花序頂端結一至二
 個小果)。有無遺傳因子不良的兩性
 株，在高溫高濕或低溫下，常開不實
 的兩性花(似雄花)或畸形果花，致
 無結果，此種樹型，僅在春季開花，
 結果始能正常。

除以上兩種原因外，土壤、水分
 、養分、病虫害及授粉不良，也能導
 致開花不結果。

(二)木瓜多施堆肥等有機肥料，不
 但對土壤有改良作用，且對品質也有
 很大效應。氮、磷、鉀三要素中以磷
 肥最重要，其配合比率為氮：磷：鉀
 為四：八：五。

木瓜栽培法，請參閱豐年第二十
 卷二十期。

嘉義縣新港鄉安和村一三八號吳
 淑媛農友來函問：有關木瓜問題，請
 參考。

WUCHSAL

WUCHSAL

好消息!!


報您豐收大賺錢

正豐露!!最新葉面營養劑

能使您增加收成20%以上



250c.c.



1,000c.c.

正豐化學公司
 台中縣霧峯鄉民生路200號
 電話：63·163

適用作物及使用方法：

種類	作物名稱	使用濃度	施後效果
木 稻	在米、落葉	五〇〇/八〇〇倍	缺苗耐寒霜增強病害預防力 發芽，增加產量
果 實 類	柑桔、葡萄、香蕉、荔枝 梨、梅、枇杷、鳳梨、櫻 桃、荔枝、櫻桃等。	新植幼苗 八〇〇倍 成株以五〇〇倍	成活力高，開花迅速，枝葉 茂盛，防止落果，增加 產量，耐貯運。
瓜 類	西瓜、西瓜、小玉仔等瓜類	五〇〇倍	對病抵抗強。
蔬 菜 類	菠菜(花)、洋蔥、豆類 馬鈴薯、蕃茄	五〇〇倍	促進生長發育，耐濕性特強
經 濟 作 物	麻竹、洋菇、棉花	五〇〇倍	保水力强，結果潔白，生產 力增高，病害抵抗力增強。
觀 賞 花 卉	玫瑰、蘭花	五〇〇/一〇〇〇倍	花色鮮艷，持久不變。