



池魚病虫害

〔問〕：(一)池塘發生病虫害應如何處理？

(二)池塘水的深度要怎樣才適宜？
(三)苗栗鎮建功里中正路三七六號賴俊豪。

〔答〕：(一)魚池發生病虫害時，應即將病魚隔離治療，如情況許可，最好將池水排乾，徹底消毒，以根治病源；如無法排乾池水，則可依其病症下藥。

(二)池塘水的深度，一般而言，以一—二公尺左右為適，但非一概而論，應依魚種、生產計畫、面積大小等條件綜合而定。(鄧火土)

芒果嫁接施肥

〔問〕：(一)本省北部地區是否適宜栽種芒果(愛文品種)？它適合生長的氣候及土質如何？

(二)芒果生長過程中為何不分枝？應該如何促其分枝發育？

(三)種苗栽植後，經過幾年才開花結果？

(四)生長過程中應施何種肥料？
(五)桃園縣平鎮鄉南勢村七鄰三號鄧拱賢

〔答〕：(一)栽培芒果的地區，在開花前與開花期間，天氣愈乾燥愈好。開花期間多雨，會影響受粉而不能

結果，或者結果稀少，則無栽培價值。
台北氣候正是這種情形，不宜種植芒果，但土質並無問題。

(二)芒果在幼齡未開花結果以前，很少分枝。如枝條過長，可在適當位置剪斷，不久就可生出分枝。

(三)嫁接的愛文芒果苗，種植後次年的春天，便可開花結果，無需經過很多年。

(四)芒果的施肥時期為三、六、九三個月，硫酸銨、過磷酸石灰及硫酸鉀的使用配合率為一：一：〇·四，如為有機肥料，請在春季施用。(張振宙)

梨樹黑斑病

〔問〕：(一)二十世紀梨果皮有黑點，然後慢慢腐敗並且裂開，此病是否為黑星病？

(二)現在梨果已採收完畢，但明年如何防治該病？

(三)該病使用那一種農藥可以預防？
(四)台中縣神岡鄉神岡路七十號王永華

〔答〕：(一)此為「黑斑病」，病徵類似黑星病。

(二)盡量清除病枝及落葉，即行燒理。在冬季落葉後，即行噴射石灰硫黃七—八倍一次。

(三)萌芽前、幼果期至採收前一個月，每隔七—十天各噴射大富丹八百倍一次，果實最好實施套袋。(李信芳)

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>魚塢肥料 N-P-K 4-14-2</p> | <p>蔬菜肥料 N-P-K 15-5-10</p> | <p>花卉肥料 N-P-K 5-10-8</p> | <p>柑桔肥料 N-P-K 16-8-12</p> |
| <p>養魚有祕訣 收穫三倍多 台肥魚塢肥料 飼養鮮魚大又肥</p> | <p>水肥有病菌 更有寄生虫 台肥蔬菜肥料 無菌無虫功效宏</p> | <p>鷄糞髒兮兮 水肥臭難受 台肥花卉肥料 清潔衛生頂不錯</p> | <p>不須再攪拌 不會被流失 台肥柑桔肥料 促進豐收實滿枝</p> |
| | | | |

台灣肥料股份有限公司基隆二廠出品
廠址：基隆東明路55號 各地經銷商均有出售