

防害採精行動的羽毛，能連根拔除則拔除，不能拔除則剪斷。

採精注意事項

採精時最好有二人合作，一個人蹲在火雞的右邊，以左手捉住火雞雙腿，以右手捉住火雞的左翼。採精者跪在火雞左邊，以左手按着火雞的右翼，以右手掌從火雞恥骨外順着龍骨往腹部緩急輕輕加壓摩擦，來回摩擦數次後，即可見到火雞尾翼微微向外張開。

此時採精者左手移到火雞肛門外，以掌背擋住尾翼，拇指與食指張開，在肛門中央左右輕加壓力，就可看到交配突起往外翻出，而精液也可自突起的中央流出，此時右手再拿一西雞雞用人工授精注射器搜集精液。

火雞的精液量很少，平均約只有〇・〇二西西左右，有的公火雞根本就擠不出精液來。每西西精液的精蟲數平均約六億。

精液使用時可用一％的生理食鹽水（一〇〇西西的蒸餾水，加入一公克的藥用食鹽，PH值要在七至八之間）稀釋，其比例為一比一。

精液與生理食鹽水混合時，兩者需同溫，把食鹽水一滴滴地加入精液內，混合均勻後再使用。火雞精液不能保存，需於採精後半小時內用完，所以動作要快。

下午授精較好

母火雞的產蛋率達五％時，即可開始人工授精，授精時需三個人合作，一個人以左手捉住火雞的雙腿，右

手捉住雙翼根部，並把火雞垂直放在膝頭上。一個人蹲在火雞左邊，左手掌擋住尾翼，右手四個指頭輕壓腹部，拇指輕按肛門下緣。另一個人是授精者，以左手拇指輕按肛門上緣，此時肛門就會向外翻出，肛門翻出後可看到兩個口，右邊是其泄腔，左邊一個是子宮口。注射器（普通雞用注射器）順着子宮盡量插入，再把精液壓進。每次授精量為〇・〇三西西，每十天授精一次即可，授精時間最好在下午。火雞體重大，無論採精或授精，操作上都較困難。

火雞實施人工授精，到底能提高多少的受精率，這依季節及自然交配的受精率而不同，如在繁殖季節前期，本省約元月至四月間，自然交配的受精率只有五成至六成時，約提高二至三成，就是受精率可提高到八成至九成間。但自然交配的受精率達七成半至八成時，實施人工授精約只能提高一成左右。

選購優良品種

目前所推廣的火雞品種為美國白火雞，雖然都是美國白火雞，但各地所出售的火雞體質有好壞之分，因此價錢也不一樣，購買時不要只聽價格，應先參觀一下他們所養的母火雞的大小。

品種優良的火雞公的約可養到二十七台斤，母的約可養到十三台斤。若母火雞小，牠的後代也不會變大。假如一隻生蛋的母火雞只有七、八台斤重，牠的雛雞再便宜也沒有意思，要養就養大的，不然乾脆養土火雞。



臺灣肥料股份有限公司出品

業務接洽處：台北市延平南路

（承辦商名單備索）

電話：二七九六（上線）

電報掛號：五一四一台北

肥効顯著
施用方便

尿素 香蕉肥料

硫酸銨 甘蔗肥料

過磷酸鈣 柑桔肥料

硝酸銨鈣 瓜果肥料

磷酸銨 花卉肥料

蔬菜肥料

歡迎採用
成份保證

電石氣

電極 乙炔黑

電極 糊石膏

液氨 石灰石

液氨 水塊石灰

液氨 氮粉石灰

液氨 氣磷

液氨 酸

液氨

主要產品

次要產品