


空氣流動，以便促進菇體表面水滴蒸發。

(3) 通氣方法

菌絲及菇體，在生長旺盛時，將排出多量二氧化碳，且須自菇舍外吸入新鮮空氣。

洋菇生長第一至第四周時，排出的二氧化碳較多，必須常打開吸風口，用抽風機抽新鮮空氣入菇舍內，若外溫適當時，可打開部分窗戶，補



採收洋菇

助抽風機的不足。

洋菇是一種好氣性菇類，菇舍內微量氣體的流動，有利於菇類生育，若不需吸入外氣時，可照常使用抽風機，關閉外界吸風口而打開內循環隔板，促進菇舍內空氣對流，屋頂上凝結水滴，也因空氣流動而蒸發。

(4) 溫度調節

本省洋菇栽培，很少有人使用冷氣或熱氣設備。菇舍內溫度極容易受外氣氣溫的影響，密閉式PE塑膠菇舍也不例外，外氣溫高時，菇舍內溫度隨之升高，外氣溫低時也隨之降低，但因有塑膠布隔絕冷風及稻草的保溫，在外氣溫低時，比較一般簡單菇舍，容易保持較適宜的溫度。

密閉式PE塑膠菇舍，除了菇舍周圍以發泡塑膠布及稻草保溫外，菇舍內溫度的調節，要靠抽風機及窗戶開關調節。

若菇舍外氣溫較低時，應在白天較溫暖時間多吸入暖空氣，升高室內溫度。

相反地，若菇舍外氣溫較高時，應在晚間較涼冷時間，多吸入冷空氣，以降低室內溫度。

發菇時期最適宜溫度為攝氏十三至十八度，所謂較高溫或較低溫均以此溫度為標準。

原裝進口，現貨供應！



英國卜內門公司附屬植物保護公司新出品
專治蚜蟲、潛葉蛾特效藥品的

新“賽福施”

Sayfos' 70DP

* 低毒無臭 · 人畜安全

* 持久浸透 · 作物無害

《詳細說明書備索》



死鼠無毒，人畜無害，安全可靠。

最有效！最經濟！

殺鼠靈毒餌餅

農復會、農林廳、糧食局
台糖公司、台灣省農會 共同推荐

台北市政府衛生局家鼠防治專用
台灣省鼠害防治推行委員會 長期採用

本公司加工供應《獨家供應》

嘉泰企業股份有限公司

公司：台北市仁愛路三段26號2樓 電話：776815, 782796

工廠：台北縣中和鄉員山路100號 電話：96-5466

發財農藥