



柿子不適高溫

〔問〕：(一)本地是否適合柿子的生長？

(二)如何栽培和管理？

(三)柿苗那裡有賣？每株價格多少？

(四)青澀果要怎樣處理才能變成甜果(現在市面上賣的柿子)？

(五)柿苗怎樣繁殖？是播種或是插枝或空中壓條？(高雄縣美濃鎮龍肚里二四號蕭文彩)

〔答〕：(一)南部氣溫較高，一四〇公尺海拔太低，不十分適合，最好能選擇五百公尺以上較為妥當。

(二)定植距離約需六×六公尺，栽培管理方法，原則上可參照一般木本果樹。

(三)請函彰化縣永靖鄉立福村二四號高嘉訓先生聯絡，每株依大小而定，約十元左右。

(四)最簡單的方法，可用澄清草木灰水或石灰水，浸一星期左右即可。

(五)用實生苗作砧木，採用「靠接」或「切接」法，不宜用「扞插」或「壓條」(李信芳)

芒果適栽砂壤

〔問〕：(一)河邊沖積砂質壤土，下層是砂質土，可否種植芒果？以何種品種為宜？前途如何？

(二)非洲青亞除虫菊如何栽培？

〔答〕：(一)我家有三公頃的香蕉園，位於屏東縣林邊鄉，現在想改種果樹，那一種栽植有利？(基隆市郵政七三三七附七號楊國泰)

〔答〕：(一)河邊沖積的砂質壤土，如排水良好，種植芒果當然合適，品種仍以美國種為宜。為恐颱風損害，應選早熟種，但須注意炭疽病的預防。

(二)除虫菊的種植不難，生產也迅速，但須先找到確實的銷路，才可大量種植，栽培方法請參考豐年十五卷二四期三一頁。

(三)香蕉園想改種他種作物，在屏東林邊鄉一帶，以熱帶性種類為宜，經濟栽培應以銷路為主。

可供考慮的種類有芒果、介壽果、木瓜、番石榴、番荔枝、印度棗、可可、椰子等，可依樹齡長短配合栽培。(黃阿臣)

花菜尺蠖防治

〔問〕：(一)我種植花椰菜，現在已經開花，只因擬尺蠖損害花蕊，雖噴過多種農藥，例如大刺農、大必隆、高連靈、富賜靈、百克虫等仍然無效，是否藥量過少？還是該虫對於上述農藥抵抗力強？

(二)如該虫抗藥力強，要用什麼藥防治？(屏東里港鄉中和村西隆路十二號黃進發)

〔答〕：花椰菜擬尺蠖的防除，噴射五十八多乃力松乳劑一千倍液(採收前四天停止噴射)，或噴射五十多賽文八百一千倍液(採收前七天

停止噴射)為宜。

噴射藥劑應用展着劑，以利藥劑粘着葉部提高藥效。(因花椰菜的葉部有蠟質，藥劑不易粘着，往往使藥效減低)

(二)你所說的藥劑，對於擬尺蠖效果差，例如以富賜靈噴射，對於小菜蛾防除很有效果，但對於擬尺蠖無效，所以虫害防除，必須明瞭各種農藥的特性及不同的殺虫力。(王進生)

菊花病虫防治

〔問〕：(一)我從今年一月起迄今，先後栽種菊花三次了，但一次也沒成功。都是由根部葉子產生黑點，逐漸往上枯乾，待含苞如中指大時，即全枝枯死，枝竿高而枯老，這是什麼道理？

(二)各品種菊花何處有賣？

(三)應施何種肥料？(花蓮萬榮郵政七八九九附八號薛祥五)

〔答〕：(一)菊花從基部葉片漸漸枯死，通常患有褐斑病、黑斑病與葉線虫。如為線虫，應使用防治線虫專用的農藥消毒土壤，如為黑褐斑病，可用「大生」依指定濃度，從幼蕾時期開始，每十天噴一次，連續七、八次則可防治。

菊花不宜連作，連作容易發生病害。又有些品種在夏季強烈陽光下生長不良，宜作適當遮蔭。

(二)土地銀行青潭苗圃(新店鎮)有很多名貴菊花品種，可函詢連絡。

(三)栽培土壤有機質要多，宜多施半熟的樹枝葉堆肥。施用化學肥料時，初期宜多施氮、鉀肥，後期則三要素平均使用。(黃敏展)

泥鰍飼養

〔問〕：(一)泥鰍的市場現況如何？

(二)泥鰍養殖如何管理？

(三)那裡可以買到有關養殖的參考書籍？

(四)泥鰍與田螺可否混養？(新竹市東大路一〇三五號彭明華)

〔答〕：(一)泥鰍的供應以往都採自天然出產的，並無專門飼養。最近市面消費量增加，所以有部分業者想試養，目前市面價格每公斤約八元左右。

(二)飼養管理：(1)水溫在二十度C時，宜給植物性餌料。(2)二二度C至二三度C時，投動物性餌料。(3)二五度C至二六度C時，投動物性餌料。(4)二十度C以下或三十度C以上，則須減少給餌，嚴冬不可投餌。

夏天炎熱，在池塘的一邊選一個七、八十公分的深穴，做為避暑場所。冬季宜注入較為暖和的地下水。池底需有二十、三十公分厚的泥土，給餌量為魚體重的二、五%，依氣候及水質變化予以增減。

(三)目前並無專門的中文書籍可以參考，除在農業有關雜誌偶有刊載外，如需專門書籍參考，可向台北市開封街一段十九號鴻儒堂書局選購外文書籍參考。

(四)泥鰍與田螺可否混養一節，根據兩者習性分析，似可混養。(鄧火土)

告訴乃論罪刑

六個月內提出

台北市顧素英女士問：
甲女的丈夫於十年前去世，留下一個女兒，今年十一歲。
甲女於去年初和丙男再婚，丙男常對女兒有正不正常的行為，甲女雖然一再勸告，丙男不但不聽並加以虐待，為此甲女無法忍受，乃携帶女兒離家出走。由於生活無着，甲女去幫人做工，把女兒送進育幼院。

去年九月間，她女兒回家，即被丙男姦污。她女兒把事情經過告訴她，但是甲女並沒有證據。

過了個多月，丙男意圖逃避責任，將此事歸罪於不知姓名的外人，請問甲女應該怎麼辦？這件案子經過多久，就不能提出告訴了？

警察電台法律顧問譚培榮律師答覆：
第一、姦淫未滿十四歲的女子，以強姦論，刑法第二百二十一條第二項有明文規定，同法第二百三十六條規定該罪須為告訴乃論（即須受害當事人提出告訴，法院才予受理）。被害人或其法定代理人，都可以向法院檢察官提出告訴，並說明受害經過，以供偵查。

第二、依刑事訴訟法第二百十



法律問題解答

• 警察廣播電台提供 •

六條規定，告訴乃論的罪刑，應自告訴人知道犯罪的時候起，在六個月內提出告訴，如果過期就無法告訴了。

不正常男女關係 應及早斷絕往來

台北縣新店鎮陳水龍先生問：
某甲是有婦之夫，乙女為有夫之婦，雙方私通已有多年。
現在乙女要和甲男斷絕往來，但是甲男却不願意，因為甲男在乙女的身上了花了很多

的錢。如果甲男用毒液傷害乙女的話，會受到什麼處罰？

警察電台法律顧問譚培榮律師答覆：
有婦之夫和有夫之婦私通，男女雙方都犯了刑法第二百零九條的妨害家庭罪，如果開出來雙方都很失面子。

現在乙女既然要和甲男斷絕往來，甲男就應該乘機避去刑責。乙女雖然花用甲男的金錢，但這是甲男自願的，甲男最好不要再計較。

如果甲男為了不願斷絕往來，而用毒液傷害乙女，就犯了刑法第二百零七十八條的重傷害罪，應該處五年以上十二年以下的有期徒刑。
現在甲男應該冷靜下來，絕不可做出這種害人害己的行為。

— 姚世莊 —

印度棗需水分

【問】：(一)在台中縣和平鄉海拔五百多公尺山坡地，栽培印度棗是否有經濟價值？
(二)何時栽培最適宜？(豐原鎮東勢里田心路五四—一號楊漢龍)

【答】：(一)印度棗果實發育期間，正值本省中南部乾季，為適合果實發育需要，須有水分充足的土壤方能栽植。屏東平地一帶，地下水充足，對印度棗的發育極為有利，所以它的產量高，果實大，品質優。

在山地乾燥地區栽培，則其產量與品質相差很大。在台中地區栽培時，應選擇與屏東平地條件相似的較為適宜。貴地山地不能充分灌溉，不宜栽植印度棗。
(二)種植時期以國曆三月上旬為最理想。(張振宙)

柑桔施肥標準

【問】：(一)台肥公司的柑桔肥料，例示，五年生柳橙每年每株施肥一公斤左右，這一公斤是針對氮肥為標準而計算出的。惟因台肥柑桔肥料是複合肥料，其中包含鉀磷兩種成分在內，依照氮肥計算例，磷肥需要二、二五〇公克，(1,000×0.18÷8%×100=2,250公克)，鉀肥一、七五〇公克(440公克×0.48÷12%×100=1,750公克)。所以如果只施複合肥一公斤時，氮肥則剛好。

如鉀磷兩種成分不足，而依照最多量的磷肥標準施用二、二五〇公克，則超出氮、鉀肥兩種需要量，究竟五年生柳橙，每年每株應施台肥柑桔肥料若干才適當？計算方式如何？
(A)磷肥依照(一)項計算，需要台肥柑桔肥二、二五〇公克(等於過磷酸鈣一八〇公克)，已施一、〇五〇公克(等於過磷酸鈣八四公克)，所以應補充過磷酸鈣九六公克。
(B)鉀肥依照(一)項計算，需要台肥柑桔肥一、七五〇公克(等於硫酸鉀二〇公克)，已施一、〇五〇公克(等於硫酸鉀一二六公克)，所以應補充硫酸鉀單肥八四公克。
照上項計算結果，第五年每株施用台肥柑桔肥一、〇五〇公克，另加施過磷酸鈣九六公克，硫酸鉀八四公克，如此計算是否正確？(台南新營鎮中興路六六巷四四號曾煥洪)

【答】：(一)本刊二十卷二十期第七頁所答的柳橙每株施肥量，是以硫酸銨(硫酸)、過磷酸石灰及硫酸鉀(硫酸加里)為標準。
該肥料量須照春肥(氮六十%、磷五十%、鉀四十%)，夏肥(氮二十%、磷三十%、鉀四十%)，秋季肥(氮二十%、磷二十%、鉀二十%)的比例施用。
(二)台肥公司的柑桔肥料成分比例，為氮十六、磷八、鉀十二，此種比例除可作春肥採用外，其他時期均不適用。
(三)要採用台肥公司的柑桔肥料作為夏秋冬施肥時，須另加磷、鉀肥料，以免發生遲延着色期，或果實品質降低等現象。(翁仁祿)